Estudio de la Amenorrea Primaria Durante el Período de 4 Años 1976 - 1980

Centro de Investigaciones Médicas
Universidad de Antioquia

Hospital Universitario San Vicente de Paúl

Carlos Javier Pilonieta P.*
Jairo García G.***
José Luis Ramírez C.***

Guillermo Henao C.****
Jorge Mario Mejía R.****
Alberto Abad C.*****
Fabio Sánchez E.****

INTRODUCCION

Se considera como amenorrea primaria la ausencia de menstruación después de los 18 años de edad; no es muy frecuente, pero existen dificultades para llegar a su causa etiológica y para tomar una conducta. La amenorrea es sólo la manifestación clínica de una entidad que es necesario diagnosticar con el fin de dar un pronóstico e iniciar el tratamiento, logrando así tranquilizar a la paciente y familiares que la rodean.

Universalmente se tiene el criterio de estudiar la paciente con amenorrea primaria después de los 18 años de edad, criterio que no compartimos si se tiene en cuenta que se pueden detectar tras-

tornos en el desarrollo de la pubertad desde una época más precoz, basados en un análisis clínico programado, complementado con exámenes de laboratorio específicos (1-2-3). Con base en esta aseveración se presentan los resultados obtenidos en un estudio de pacientes con amenorrea primaria efectuado durante un período de 4 años.

Material y Métodos

Se incluyen en el estudio las pacientes que consultaron por amenorrea primaria durante el período comprendido entre enero 1 de 1976 a diciembre 13 de 1979, a la consulta de Ginecología Endocrina y Reproducción Humana, del Departamento de Obstetricia y Ginecología,

* Residente IV Visitante Hospital Militar.

*** Médico Genetista, Departamento Morfología. U. de A.

***** Médico Gineco Endocrinólogo. Unidad de Ginecología Endocrina y Reproducción Humana, U. de A.

***** Médico Endocrinólogo. Laboratorio de Endocrinología Clínica Soma.

Reimpresos:

Doctor Fabio Sánchez Escobar. Departamento de Obstetricia y Ginecología. Hospital San Vicente de Paúl.

Universidad de Antioquia, Hospital Universitario San Vicente de Paúl, Medellín.

Todas las pacientes fueron referidas por los servicios de la consulta externa y los Centros de Salud del Municipio. De acuerdo a los hallazgos físicos se practicaron a las pacientes exámenes complementarios a saber: citología funcional, biopsia de endometrio, cromatina sexual, cariotipo y determinaciones hormonales: hormona folículo estimulante (FSH), hormona luteinizante (LH) y prolactina (PRL) en plasma; 17 cetosteroides y 17 hidroxisteroides en orina de 24 horas.

Esta metodología difiere de otras ya publicadas (4-5-6-7). Las pacientes estudiadas se clasificaron en 3 grupos, de acuerdo a su causa etiológica así:

1. Anatómica:

Si la causa de la amenorrea era a nivel del efector o de las vías de drenaje.

2. Genética:

Si la causa era el resultado de un trastorno cromosómico, de receptores o enzimático.

3. Endocrina:

Si la causa se debía a un trastorno funcional u orgánico en el eje hipotálamo, hipófisis u ovario.

RESULTADOS

De un total de 1.250 pacientes que consultaron a la unidad de Ginecología Endocrina y Reproducción Humana durante los 4 años del estudio, se diagnosticó amenorrea primaria en 53 pacientes, lo cual equivale a un promedio de 4 pacientes por cada 100 (4%).

De las 53 pacientes, en 44 (88.3%) se completó el estudio y llenaron los requisitos necesarios para un diagnóstico adecuado.

Del total de pacientes con amenorrea primaria, sólo el 22.6% tenían vida sexual activa (tabla No. 1).

Tabla No. 1

CLASIFICACION DE 53 PACIENTES CON AMENORREA PRIMARIA DE ACUERDO AL ESTADO CIVIL (1976-1979) H.U.S.V. DE P. - U. DE A.

Estado Civil	No. de Pacientes	Porcentaje
Casadas	12	22.6%
Solteras	41	77.4

El 60.4% de las pacientes consultaron tardíamente, después de los 20 años de edad y correspondió el mayor porcentaje al grupo entre los 20 a 24 años (37.7%). Sólo el 5.7% lo hizo después de los 30 años (Tabla No. 2).

Tabla No. 2

DISTRIBUCION POR EDADES DE 53 PACIENTES CON AMENORREA PRIMARIA: H.U.S.V. DE P. - U. DE A., 1976-1979

Años	No. de pacientes	Porcentaje
20	21	39.6
20 - 24	20	37.7
25 - 29	9	17.0
30 ó más	3	5.7

El 79.2% de las pacientes presentaban caracteres sexuales secundarios en el momento de la consulta, de éstas el 22.6% habían recibido tratamiento hormonal sin diagnóstico clínico previo. Sólo 11 pacientes (20.8%) tenían infantilismo sexual, fenómeno que induce a una consulta más precoz (Tabla No. 3).

Tabla No. 3

**CLASIFICACION DE 53 PACIENTES
CON AMENORREA PRIMARIA DE
ACUERDO A LA PRESENCIA DE
CARACTERES SEXUALES
SECUNDARIOS. H.U.S.V. DE
P. - U. DE A. 1976-1979**

CARACTERES SEXUALES				
	Infantiles		Presentes	
		Espon- tá- neos	Inducidos	Total
Pacientes	11	30	12	53
Porcentaje	20.8	56.6	22.6	100

En la Tabla No. 4 se aprecia que el 59.5% de las pacientes con desarrollo de la glándula mamaria consultaron después de los 20 años de edad, mientras que el 54.5% que presentaban ausencia de la glándula mamaria lo hicieron más precozmente.

Tabla No. 4

**CLASIFICACION DE 53 PACIENTES
CON AMENORREA PRIMARIA
DE ACUERDO AL DESARROLLO
DE LA GLANDULA MAMARIA
H.U.S.V. DE P. - U. DE A., 1976-1979**

GLANDULA MAMARIA		
Años	Presente	Ausente
- 20	17 (40.5%)	6 (54.5%)
+ 20	25 (59.5%)	5 (45.5%)
Total	42 (100.0%)	11 (100.0%)

El estudio de los factores etiológicos en las 44 pacientes con amenorrea se observa en la Tabla No. 5. El factor genético ocupa el primer lugar como causa de amenorrea primaria y representa el 47.7% (21 pacientes) seguido

en su orden por el factor anatómico 29.5% y el endocrino 22.8%.

Tabla No. 5

**DISTRIBUCION DE 44 PACIENTES
CON AMENORREA PRIMARIA
SEGUN LA CAUSA ETIOLOGICA
H.U.S.V. DE P. - U. DE A., 1976-1979**

	Número Total de pacientes	
I. GENETICA	21	(47.7%)
II. ANATOMICA		
Congénita	9	
Adquirida	4	13 (29.5%)
III. ENDOCRINA		
Funcional	9	
Tumoral	1	10 (22.8%)
TOTAL	44	(100.0%)

**DISTRIBUCION DE 44 PACIENTES
CON AMENORREA PRIMARIA
SEGUN LA CAUSA ETIOLOGICA
H.U.S.V. - U. DE A. 1976-1979**

En la Tabla No. 6 las pacientes se clasifican de acuerdo al diagnóstico etiológico. Puede observarse que la **causa genética** más frecuente es la disgenesia gonadal con un 90.5% (21 pacientes).

El síndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH) representa el 69.2% de la **causa anatómica**. Los síndromes de anovulación crónica: ovario poliquístico e hiperplasia suprarrenal congénita ocupan el 80% de la **causa endocrina**.

La Tabla No. 7 muestra el orden de frecuencia de las causas etiológicas de la

amenorrea primaria. Le corresponde el primer lugar a la disgenesia gonadal 43.2% y le siguen el síndrome de

Fig. 2

**DISTRIBUCION DE 44 PACIENTES
CON AMENORREA PRIMARIA
SEGUN CAUSA ETIOLOGICA
Y DIAGNOSTICO CLINICO
HUSVP-U. DE. A. 1976-1979**

MRKH. (20.5%), la hiperplasia suprarrenal congénita. (11.4%), la tuberculosis genital (9.0%) y el síndrome de ovario poliquístico (6.8%). Con menor frecuencia el craneofaringioma y la pubertad retardada, con un 2.3%.

Al analizar la **causa genética**, Tabla No. 8, la disgenesia gonadal pura XX ocupa el primer lugar (61.9%). Siguen en orden de frecuencia el mosaicismo y el síndrome de Turner. Sólo a una paciente se le diagnosticó isocromía de

Tabla No. 6

**DISTRIBUCION DE 44 PACIENTES
CON AMENORREA PRIMARIA
SEGUN EL DIAGNOSTICO CLINICO
H.U.S.V. DE P. - U. DE A., 1976-1979**

Causa Etiológica	Número de Pacientes	Porcentaje
CONGENITA		
Disgenesia Gonadal	19	(90.5%)
Síndrome de Insensibilidad Androgénica	2	
ANATOMICA		
Síndrome de Rokitansky	9	(69.2%)
Tuberculosis Genital	4	
ENDOCRINA		
Hiperplasia Suprarrenal Congénita	5	(50.0%)
S. de Ovario Poliquístico	3	
Pubertad Retardada	1	
Craneofaringioma	1	
TOTAL:	44	

brazos largos. Tres pacientes con diagnóstico de disgenesia gonadal pura (14.3%) no fueron clasificadas, debido a que no se logró estudiar el cariotipo, una de ellas presentaba cromatina negativa.

En el grupo de pacientes con insensibilidad androgénica, una paciente se clasificó como un síndrome de feminización testicular y otra como un síndrome incompleto tipo II (hipospadia perineoesrotal pseudo vaginal) a quien se le diagnosticó un seminoma por estudio anatomo-patológico.

La Tabla No. 9 muestra la talla promedio de las pacientes con disgenesia gonadal: se aprecia que en la disgenesia gonadal pura se alcanza una talla mayor (1.58 mts en promedio) mientras que en las pacientes con alteraciones del cromosoma X, la talla es de 1.45 mts ó menos.

Tabla No. 7

CLASIFICACION DE 44 PACIENTES
CON AMENORREA PRIMARIA
SEGUN LAS DIFERENTES
ENTIDADES CLINICAS EN
ORDEN DE FRECUENCIA
H.U.S.V. DE P. - U. DE A., 1976-1979

	Número de pacientes
Disgenesia Gonadal	19 (43.2%)
Síndrome de Rokitansky	9 (20.5%)
Hiperplasia Suprarrenal	5 (11.4%)
Tuberculosis Genital	4 (9.1%)
Síndrome de Ovario Poliquístico	3 (6.8%)
Síndrome de insensibilidad Androgénica	2 (4.7%)
Pubertad Retardada	1 (2.3%)
Craneofaringioma	1 (2.3%)

Figura No. 3

CLASIFICACION DE 44 PACIENTES
CON AMENORREA PRIMARIA
DE ACUERDO A LA ENTIDAD
CLINICA HUSVP – U. de A.
1976–1979

Tabla No. 8

CLASIFICACION DE 19 PACIENTES
CON AMENORREA PRIMARIA
SEGUN LA CAUSA GENETICA -
H.U.S.V. DE P. - U. DE A., 1976-1979

Disgenesia Gonadal - Pura XX	10 (47.6%)
Disgenesia Gonadal no clasificada	3 (14.3%)
Mosaicismo (XX/X)	3 (14.3%)
Turner	2 (9.5%)
Isocromía de Brazos largos	1 (4.8%)
Insensibilidad Androgénica completa	1 (4.8%)
Incompleta Tipo II	1 (4.8%)
TOTAL:	21

Tabla No. 9

CLASIFICACION DE 19 PACIENTES
CON DISGENESIA GONADAL DE
ACUERDO A LA TALLA
H.U.S.V. DE P. - U. DE A., 1976-1979

	Número pacientes	Talla Promedio cm
Pura	13	153.8
Isocromía de Brazos Largos	1	145
Mosaico	3	144
Turner	2	134

Al analizar la **causa anatómica**, Tabla No. 6, la mayor frecuencia corresponde a la causa congénita, síndrome de MRKH con el 69.2% (9 pacientes) y el 30.8%

Tabla No. 10

**CLASIFICACION DE LAS PRINCIPALES CARACTERISTICAS EN 9 PACIENTES
CON EL SINDROME DE ROKITANSKY
H.U.S.V. DE P. - U. DE A., - 1976-1979**

Nombre	Edad	Talla	Mamas Tanner	Genitales	Malformaciones	Urografía Secretora	Cariotipo Cromatina	Neovagina Quirúrgica
ML	20	142	V	Saculación Vaginal	No	No	46XX/11%	No
MJ	22	152	V	Agnesia Vaginal	No	No	20%	No
LA	18	145	IV	Agnesia Vaginal	Vértebra Dorso Lumbar	Ectopia Renal Cruzada	29%	No
BZ	22	150	IV	2 cm Vagina	No	Normal	20%	No
ES	31	—	V	2 cm Vagina	No	Normal	20%	Si
RG	19	158	IV	2 cm Vagina	No	Normal	6%	No
RH	18	---	V	Agnesia Vaginal	No	Normal		No
LS	22	165	IV	Agnesia Vaginal	Klippel-Feil Vértebra Cervi- cal	Ectopia Renal Cruzada	46,XX-45,X/9%	Si
LP	20	152	V	Agnesia Vaginal	Cardiopatía (CIA)	Normal		Si

(4 pacientes) a la tuberculosis genital como única causa adquirida.

La Tabla No. 10 resume los hallazgos obtenidos de las pacientes con el síndrome de MRKH quienes tienen una talla promedio de 1.52 metros. En dos pacientes de 9 (22%) se encontraron malformaciones renales (ectopia renal cruzada) asociadas a malformaciones vertebrales. Una de estas pacientes se clasificó como síndrome de Rokitansky-klippel Feil y presentaba un mosaicismo (46 xx/45x); en otra de las pacientes se sospechó mosaicismo al presentar una cromatina sexual del 6% pero no se confirmó porque no se practicó el cariotipo. Tres pacientes se intervinieron quirúrgicamente con el fin de practicar neovagina y 4 presentaban saculación vaginal al momento del examen.

Al analizar la causa endocrina (Tabla No. 11) la alteración funcional es la etiología más frecuente así: la hiperplasia suprarrenal congénita ocupa el primer lugar (50%), siguiendo en su orden el síndrome de ovario poliquístico (30%) y un caso de pubertad retardada. Un sólo caso fue diagnosticado como craneofaringioma y fue fatal durante la intervención quirúrgica.

Discusión

Aunque son varios los esquemas propuestos para el estudio de la amenorrea primaria, para el clínico es un dilema elegir el más adecuado, pues el interés es el de llegar a un diagnóstico rápido con el mínimo número de exámenes, evitando gastos innecesarios y la prescripción

Tabla No. 11

**CLASIFICACION DE 10 PACIENTES
CON AMENORREA PRIMARIA
SEGUN CAUSA ENDOCRINA
H.U.S.V. DE P. - U. DE A., 1976-1979**

I. DISFUNCIONAL

Hiperplasia Suprarrenal	5 (50%)
Síndrome de Ovario	
Poliquístico	3 (30%)
Pubertad Retardada	1 (10%)

II. TUMORAL

Craneofaringioma	1 (10%)
------------------	---------

empírica de agentes hormonales como tratamiento sintomático.

El plan de estudio de las pacientes con amenorrea primaria, en el cual predomina el análisis clínico, permite la orientación diagnóstica basada en los hallazgos encontrados durante el examen. Rápidamente se llega a un diagnóstico presuntivo y se establecen puntos de etiología y tratamiento. En nuestro estudio, al utilizar este plan, se confirmó el diagnóstico clínico inicial en el 80% de las pacientes y se facilitó además el diagnóstico final en el 20% restante.

En el presente estudio se observó que sólo un número muy bajo de pacientes con amenorrea primaria llegan a la consulta ginecológica especializada (4%); sin embargo no por esto dicha alteración carece de importancia clínica. La falta de un criterio definido para el diagnóstico y tratamiento de estas pacientes hace que tengan un promedio mayor de consultas, que pacientes con otras entidades clínicas. A veces por dilación en tomar una conducta adecuada se corre el peligro de que progresen lesiones expansivas intra y extra selares; así mismo, la disgenesia gonadal XY puede evolucionar a procesos malignos. Esta misma dilación hace que no se preste una adecuada y

oportuna asistencia psicológica a pacientes con infantilismo o indiferenciación sexual.

En el presente estudio también se observó que la frecuencia de las causas etiológicas de la amenorrea primaria está de acuerdo con los diferentes informes presentados por otros investigadores (8), resultado obtenido por una metodología diferente.

Las pacientes las hemos clasificado según causa **genética, anatómica y endocrina**, por considerar que esta clasificación es muy didáctica, a diferencia de otras que dividen en **central ovárica, uterina y vulvar**.

La disgenesia gonadal como consecuencia de alteración cromosómica (mosaicismos, isocromía del brazo largo del cromosoma X, o la ausencia de un cromosoma X) está asociada a baja estatura, hallazgo que tiene como punto común la falta del brazo corto del cromosoma X, donde posiblemente se encuentra localizado alguno de los genes determinante de la talla (9). Este hallazgo observado en el presente trabajo en donde el síndrome de Turner alcanzó un promedio de 1.34 metros mientras que en el mosaicismos, el promedio más alto es de 1.44 metros, siempre inferior a la talla alcanzada por la disgenesia gonadal pura.

En el presente estudio las 13 pacientes con disgenesia gonadal pura tenían un promedio de talla de 1.53, el cual es inferior al informado por otros autores. Este hallazgo puede explicarse por el hecho de que en nuestra población los percentiles de talla están por debajo de lo informado en países más desarrollados.

A diferencia de las pacientes con síndrome de Turner la disgenesia gonadal pura tiende a manifestarse en más de un miembro de la familia (10), pues su transmisión se hace en forma autosómica

recesiva o recesiva unida al cromosoma X (10-11). En este informe sólo a 2 hermanas se les diagnosticó disgenesia gonadal pura XX.

Según algunos informes de la literatura la mayor frecuencia de la disgenesia gonadal pura tiene un complemento cromosómico XX y sólo el 10% es XY (Síndrome de Swyer). En el presente estudio no se encontró ningún caso XY.

La disgenesia gonadal pura XY y aquellas entidades con fenotipo femenino y con complemento cromosoma Y, tales como el síndrome de insensibilidad androgénica, disgenesia gonadal mixta y hermafroditismo verdadero, presentan un índice muy alto de malignización de la gonada, que es mayor y más precoz, en su aparición cuanto más indiferenciada sea ésta (12).

A dos pacientes de este estudio se les diagnosticó un síndrome de insensibilidad androgénica. Una de ellas era un testículo feminizante completo y la otra un testículo feminizante tipo II (hipospadía perineo escrotal pseudo vaginal), a esta última se le diagnosticó un seminoma a la edad de 25 años.

Los resultados obtenidos en el presente estudio y los informados en la literatura están de acuerdo con la menor frecuencia del síndrome de Turner, (10.5%). Sin embargo, este síndrome, por los hallazgos clínicos tan evidentes, permanece como el modelo clásico para referirse a la disgenesia gonadal.

Es importante destacar que no sólo las alteraciones de los cromosomas sexuales son responsables de la disgenesia gonadal, sino también las alteraciones (delecciones) a nivel de los autosomas 13 y 18 (13).

En el presente estudio las malformaciones anatómicas ocuparon el segundo lugar como causa de amenorrea primaria

y le correspondió al síndrome de Mayer Rokitansky Kuster Hauser el primer lugar en este grupo (69.2%). Es interesante observar que esta última entidad ocupa el segundo lugar como causa de amenorrea primaria, al discriminar la disgenesia gonadal en sus diferentes entidades clínicas (Tabla No. 12). En el presente estudio las pacientes con el síndrome de MRKH consultaron tardíamente, promedio de 21 años de edad; esta actitud es el resultado de la presencia en la paciente de caracteres sexuales secundarios, a diferencia de aquellas con infantilismo, indiferenciación sexual o alteración en los conductos del seno urogenital, que consultan más precozmente.

Tabla No. 12

**CLASIFICACION DE 44 PACIENTES
CON AMENORREA PRIMARIA
SEGUN LA ENTIDAD CLINICA
ESPECIFICA EN ORDEN
DE FRECUENCIA
H.U.S.V. DE P. - U. DE A., 1976-1979**

Disgenesia Gonadal Pura	13 (29.5)
Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser	9 (20.4)
Hiperplasia Suprarrenal Congénita	5 (11.4)
Tuberculosis Genital	4 (9.1)
Síndrome de Ovario Poliquístico	3 (6.8)
Mosaicismo	3 (6.8)
Insensibilidad Androgénica	2 (4.5)
Síndrome de Turner	2 (4.5)
Pubertad Retardada	1 (2.3)
Isocromía de Brazos Largos	1 (2.3)
Craneofaringioma	1 (2.3)

Tabla No. 13

**CLASIFICACION DE 44 PACIENTES CON AMENORREA PRIMARIA SEGUN
EL ORIGEN GONADAL O EXTRAGONADAL
H.U.S.V. DE P. — U. DE A., 1976-1979**

Disgenesia Gonadal Pura	13	Síndrome de Rokitansky	9 (56.8%)
		Hiperplasia Suprarrenal	5
Disgenesia Gonadal en Mosaico		Tuberculosis Genital	4
Síndrome de Turner	2	Síndrome de Ovario Poliquístico	3
Isocromía de Brazos Largos	1	Pubertad Retardada	1
		Craneofaringioma	1
		Insensibilidad Androgénica	2
TOTAL:		19 (43.2%)	25 (56.8%)
Ross GT (11 autores) (Williams Text Book)	310 (59.8%)		208 (40.4%)

Por lo anterior se puede concluir que el hallazgo de una alteración utero-vaginal con presencia de caracteres sexuales secundarios, en una etapa tardía de la pubertad, determina el diagnóstico de un síndrome de MRKH. De las 9 pacientes con el síndrome de MRKH 2 de ellas presentan simultáneamente malformaciones urológicas y vertebrales; en relación con las alteraciones vertebrales una de las pacientes se clasificó como un síndrome de Rokitansky-Klippel Feil, en donde la agenesia útero-vaginal se asocia con cuello corto, fusión de vértebras cervicales, limitación no dolorosa de los movimientos de la cabeza e implantación baja del cabello (13-16).

Según informes de la literatura las alteraciones cromosómicas en el síndrome de MRKH son raras (14); sin embargo, en el presente estudio se detectó una paciente con cariotipo 46, XX/45X, con 9% de cromatina sexual; posiblemente otra paciente con una cromatina sexual

del 6% pudo tener un patrón similar. En estas últimas pacientes el hallazgo de un mosaico, y ante la presencia de ovarios funcionantes, nos hace pensar que la línea cromosómica predominante es de 46XX, hallazgo cromosómico que suele asociarse a menopausia prematura, posiblemente debido a un número limitado de folículos funcionantes, determinado por la constitución cromosómica (15).

Teniendo en cuenta lo anterior sugerimos que en las pacientes con el diagnóstico de MRKH es aconsejable practicar cariotipo con el fin de investigar alteraciones cromosómicas y establecer así un diagnóstico diferencial con los síndromes incompletos de insensibilidad androgénica. En nuestra opinión el diagnóstico del síndrome de MRKH es el resultado de un análisis clínico adecuado, complementado con el estudio cromosómico.

La tuberculosis genital (TBG) aunque presente en nuestra población como

consecuencia de las pésimas condiciones existentes, raras veces se piensa en ella como causa de amenorrea primaria, pues su manifestación es muy tórpida; sin embargo, se destaca en este estudio por ser la única causa adquirida de amenorrea.

La tuberculosis genital es la única causa adquirida de amenorrea primaria (16) y es secundaria a un proceso pulmonar o peritoneal; su diagnóstico se hace mediante el empleo de uno o varios métodos, tales como la biopsia de endometrio, histerosalpingografía, laparoscopia o laparatomía; además el cultivo de endometrio o de líquido peritoneal, los cuales no fue posible efectuar en nuestro medio.

En las pacientes con amenorrea primaria al efectuar la biopsia de endometrio, se encontró una atrofia endometrial, que es el resultado de su destrucción por el bacilo tuberculoso. Esta atrofia endometrial se asocia a un adecuado influjo hormonal a nivel de efectores tales como picnosis elevada, moco filante y con helecho, curva de temperatura bifásica.

En estos casos de atrofia endometrial es muy difícil encontrar el bacilo de Koch, pues la atrofia es una lesión residual, secundaria a la lesión tubárica, dando como resultado un mal pronóstico para la fertilidad.

El **factor endocrino** ocupa el último lugar como causa de amenorrea primaria con el 22%, siendo la hiperplasia suprarrenal la entidad más frecuente; esta entidad tiene diferentes manifestaciones clínicas como consecuencia del grado de déficit enzimático, presentándose en la niñez con diferentes grados de ambigüedad sexual cuando el déficit es severo o durante la pubertad o en la edad adulta, cuando el déficit es parcial (17).

Esta entidad se acompaña de anovulación crónica asociada a trastornos del ciclo, hirsutismo y acné.

De las 5 pacientes con hiperplasia suprarrenal 2 tenían un déficit enzimático severo y por lo tanto presentaban diversos grados de indiferenciación sexual, por lo cual se les practicó cirugía reconstructiva; 3 sólo presentaban amenorrea sin alteraciones anatómicas.

El síndrome de ovario poliquístico como alteración funcional del eje hipotálamo-hipófisis ovario es de carácter progresivo y por lo tanto raras veces es causa de amenorrea primaria; (18) ocupó el segundo lugar en la causa endocrina con una frecuencia del 6.8% en relación al total de pacientes estudiadas; no se encontraron otras causas de anovulación tales como obesidad, hiperprolactinemia o hipertiroidismo.

Al desglosar las causas de la amenorrea primaria en los diferentes diagnósticos, continúa la causa genética siendo la más frecuente, con la disgenesia gonadal pura, 29.5%; el síndrome de MRKH con el 20.4% como causa anatómica y la hiperplasia suprarrenal con el 11.4%, como causa endocrina.

Si se dividen las pacientes con amenorrea primaria de acuerdo a la causa gonadal o extragonadal, la mayor frecuencia corresponde a este último grupo con un 56.8%, diferente a los datos informados por ROSS (8), debido a que en nuestro estudio el síndrome de ovario poliquístico lo clasificamos como de causa extragonadal. Si unificáramos estos criterios los resultados serían sensiblemente iguales.

Es necesario enfatizar la importancia de no administrar ningún tratamiento hormonal antes de confirmar el diagnóstico, pues se corre el riesgo de enmascarar el cuadro clínico. La actitud del médico en estos casos es de dar un estímulo a la paciente para continuar el estudio, iniciar una terapia de apoyo antes de llegar a un diagnóstico definitivo. Se tiene en cuenta que raras veces la entidad

clínica causal exige un tratamiento de urgencia. La amenorrea no es un diagnóstico sino síntoma de un proceso más complejo que amerita ser diagnosticado.

La importancia del presente estudio fue no sólo el llegar a un diagnóstico etiológico de la amenorrea primaria antes de iniciar el tratamiento médico, sino el predecir su futuro.

1. Se encontraron alteraciones congénitas cardiovasculares en dos pacientes (Turner y MRKH) y vertebrales y renales en otros dos MRKH.
2. La malignización gonadal, se diagnosticó en una paciente (2.3%).
3. De acuerdo a la talla, 6 pacientes (13.6%), son de baja estatura de causa cromosómica, y el resto, 38 pacientes 86.4% de estatura normal o elevada.
4. En relación con el pronóstico sexual y obstétrico, 11 pacientes (25%), tenían imposibilidad para efectuar un coito (9 pacientes con el diagnóstico del síndrome de Rokitsky, una con insensibilidad androgenica tipo II y una con hiperplasia suprarrenal, las dos últimas con genitales ambiguos).

Un total de 35 pacientes (79.5%), son de mal pronóstico obstétrico; sólo 9 pacientes (20.5%) son de mejor pronóstico y pertenecen al grupo de causa endocrina.

5. Terapia hormonal: se inició sólo al confirmar el diagnóstico o al menos con las determinaciones hormonales básicas y la toma de algunos exámenes complementarios (edad ósea, cromatina sexual, cariotipo y determinaciones hormonales).

El tratamiento hormonal tiene los siguientes objetivos:

a) Desarrollar los caracteres sexuales secundarios, utilizando estradiol a la dosis de 1 mg/día, indefinidamente, hasta obtener un desarrollo adecuado de la glándula mamaria hasta Tanner III, permitiendo al mismo tiempo el desarrollo normal de la talla al acelerar el desarrollo y la disolución a nivel de la metafásis, en forma progresiva; posteriormente se inicia una terapia secuencial para desencadenar la menstruación.

b) En aquellas pacientes que tengan una disfunción hipotálamo hipofisiaria, secundaria a una alteración suprarrenal, se prescribe terapia a base de dexametasona, 0.5 a 0.75 mg a las 11 p.m. por 15 a 30 días hasta obtener una excreción de 17 cetosteroides en orina de 24 horas por debajo de 10 mg; con esta terapia, cuando se inicia antes de los 20 años, se obtiene desarrollo de los caracteres sexuales, menstruaciones y ocasionalmente ovulación o ciclos anovulatorios, cuando la terapia es más tardía.

En los casos en que se diagnostica un síndrome de anovulación crónica con estro persistente, se da una terapia, cíclica cada mes a base de progestágenos (10 mg del 21 al 25 ciclo), con el fin de desencadenar menstruaciones.

En los casos de atrofia endometrial se debe descartar fuera de la hiperplasia suprarrenal, los estados de hiperprolactinemia, y en este caso el tratamiento es a base de drogas dopaminérgicas.

c) En raras ocasiones se logra la ovulación en pacientes con amenorrea primaria (sólo en las de causa endocrina).

d) Algunas de estas pacientes necesitan evaluación psiquiátrica; la mayoría sólo necesitó el apoyo psicológico del médico tratante, orientado a explicarles su tratamiento y el futuro obstétrico y ginecológico.

STUDY OF PRIMARY AMENORRHEA DURING A FOUR YEARS PERIOD

Summary:

53 patients with primary amenorrhea were analyzed during a four years period, from 1976 to 1979, applying a deductive clinical method which we think is very usefull in practice. The frequency of primary amenorrhea is 4% in a reference service; 44 of the 53 patients who looked for consultation were studied and the results showed the highest frequency in the genetic group, followed, in their order, by the anatomic and endocrine causes. Pure gonad dysgenesis syndrome was the predominant clinical entity, followed by the Rokytansky syndrome.

Tuberculosis, as unique entity obtained, shows a 9.1% frequency. The patients with the best prognosis regarding fertility correspond to the group of endocrine cause.

Resumen

Se analizan 53 pacientes con amenorrea primaria durante un período de 4 años, 1976-1979, utilizando un método clínico deductivo, el cual creemos es de mayor utilidad práctica. La frecuencia de amenorrea primaria es de un 4% en un servicio de referencia. De 53 pacientes que consultaron 44 fueron estudiadas, correspondiendo la mayor frecuencia al grupo genético, siguiéndole en su orden la causa anatómica y la endocrina. El síndrome de disgenesia gonadal pura fue la entidad clínica predominante, seguido del síndrome de Rokytansky.

La tuberculosis como única entidad adquirida presenta una frecuencia alta de 9.1%. Las pacientes con mejor pronóstico en relación a la fertilidad pertenecen al grupo de causa endocrina.

Bibliografía

1. ZARATE A. (Información personal).
2. SANCHEZ F., GARCIA J. Manejo clínico de la amenorrea primaria (en prensa).
3. SANCHEZ F., GARCIA J. Alteraciones del ciclo menstrual: Amenorrea en Ginecología y Obstetricia, texto integrado 2a. ed. pág. 3 1980, Ed. U. de A. Medellín.
4. KUPPERMAN Hs, LEFKOVICS (1957) Progesterone in problem of sterility; diagnostic and therapeutic use: Fertil Steril 8: 131.
5. GILSON MD, KNAB DR (1973) primary amenorrhea. A simplified approach to diagnosis, Am. J. Obstet 117:400.
6. ZARATE A., CANALES ES (1972). Estudio de la paciente con amenorrea. Rev. MedicIMSS 11: 201.
7. NAKANO R. HASHIBA N. KOTSUJIF. TOJOS: (1977) A. squematic approach to the work-up of amenorrea, Fertil Steril 28: 229.
9. Mc. DONOUGH P. (1972), Disgenesia Gonadal y sus variantes. Clin. Nort. Am. 19:631.
8. ROSS, G.T. y VANDE WIELE, R.L. The ovaries en Texbook of endocrinology, 5a. ed. Williams, R. M. Ed. Filadelfia, WB Saunders, 1974.
10. SIMPSON JL, CHRISTAKOS A. HORWIT M, SILVERMAN FS. Gonadal-dysgenesis in individuals with aparently nor-

- mal chromosomal complements: Tabulation of cases and compilation of genetic data in Birth, vol. VII pág. 215.
11. BRUNETEAU DW, SIPAHIOGLU IB, BYRD JR, GREEBLAT RB (1976), Pure gonadal dysgenesis with and Report of two cases. Am. J. Obstet. & Gynecol 124:255.
 12. MANUEL M., KATAYAMA, P., JONES HUNT (1976) Age of occurrence of gonadal tumors in intersex patients with aY Chromosome. Am. J. Obstet Gynecol 124: 293.
 13. RAMSEY J. BLIZNAK J. (1971), KLIPPEL. Syndrome with renal agenesis and, others anomalies. Am J. Roetgenol Radium ther Nucl Med. 113:460.
 14. RODRIGUEZ S., JIMENEZ M., FORSBACH, G., CANALES, SORIA J. ZARATE, A. (1977), Síndrome de Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser de tipo familiar Gacet Medic Mex 113: 447.
 15. SCOTT R.B., CAMERON, J.S., OGG, S. (1971). XO/XX mosaicism in the Rokitansky-Kuster-Hauser syndrome. Lancet 2: 1380.
 16. INDUÑATE, DM, CORREA, CC, ARREOLA, MA, LOPEZ, J.J. HERNANDEZ AYUP S. (1979) amenorrea primaria de etiología fímica. Ginec. Obstet. México 46: 363.
 17. JUBIZ W. The Adrenals en Endocrinology 1a. ed., Mc Graw Hill Ed. New York, pág. 80 1979.
 18. CANALES, E.S., ZARATE, A., CASTELAZO-AYALA L. 1971. Primary amenorrhea associated with polycystic ovaries: endocrine, cytogenetic and therapeutic considerations Obstet, Gynec. 37: 205.
 19. DEL CORRAL F., ZUÑIGA, J.E., (1975) Amenorrea-ponencia oficial. Rev. Colomb. Ginecol 26:97.
 20. CARDONA F., GARCIA J., VASSEUR DE P. O. Amenorrea y la prueba de la progesterona, Pregnandirol, Rev. Col. Obstet. Ginec. 26: 157