SERVICIO CIENTIFICO ROCHE

GANTRISIN* 'Roche'* Ref. No. 45

BISCHOFF, P. A. UPCHURCH, K. P. CARTER, J. J. Dpto. Obst. y Ginec., Tripler Army Hosp. Honolulu, Hawaii.

Obstetricia y Ginecología: La administración de la crema vaginal de Gantrisin en el post-parto hizo disminuir significativamente la frecuencia de vaginitis, cervicitis y erosiones.

THE USE OF SULFISOXAZOLE CREAM IN THE POST-PARTUM PATIENT

EL USO DE LA CREMA DE SULFISOXAZOL EN LA PACIENTE DESPUES DEL PARTO

Am. J. Obst. & Gynec., 71: 113; 1956

La prevención de las enfermedades cervicales y vaginales resultantes del embarazo y del parto es uno de los mayores objetivos de la obstetricia moderna. Aunque el tratamiento de estas afecciones es hoy rutinario en las clínicas bien montadas, se otorga en cambio poca atención a la profilaxis durante el post-parto.

Los cambios anatómicos y fisiológicos que tienen lugar durante el embarazo e inmediatamente después del parto predisponen a las vaginitis y cervicitis. El propósito de este estudio fué el de determinar si el uso de una crema vaginal antibacteriana alteraría significativamente la frecuencia de vaginitis y cervicitis post-parto. Con ese objeto se utilizó el Gantrisin 'Roche' crema vaginal, que contiene un 10% de sulfisoxazol en una base cremosa evanescente.

El material incluído en el estudio comprende a 300 multíparas con partos a término o casi a término en todas las cuales se había realizado una episiotomía. A la mitad de ellas se les dió el Gantrisin crema vaginal instruyéndolas para que cada noche se introdujeran un aplicador lleno del preparado, iniciando el tratamiento a los 7 días del parto y continuando hasta acabar el tubo de 90 g., o sea unas 2 ó 3 semanas. En la otra mitad, que sirvió de control, no se empleó ningún medicamento. A todas las pacientes se les instruyó para que no emplearan duchas ni tuvieran relaciones sexuales hasta volver a ser examinadas 6 semanas después. En ese momento se hizo un examen ginecológico. El Cuadro 1 muestra la frecuencia de trastor-

^{*} Marca de fábrica.

nos vaginales y cervicales hallados en los dos grupos. La frecuencia de afecciones cervicales y vaginales fué de un 20% en el grupo tratado y de un 38,6% en el grupo no tratado, es decir, casi el doble.

CUADRO I

FRECUENCIA DE ENFERMEDADES HALLADAS EN 300 CASOS AL CABO DE 6 SEMANAS

	Nº total de pacientes	N ^o de pacientes con trastornos	N ^o de pacientes sin trastornos	% de enfermedades
Tratados	150	30	120	20
Controles	150	58	92	38,6

El Cuadro II muestra los tipos de enfermedades hallados. En varios casos existía más de una entidad patológica, por cuyo motivo el número de pacientes del Cuadro II excede al del Cuadro I.

CUADRO II

TIPO DE ENFERMEDAD HALLADO EN 150 CASOS TRATADOS
Y 150 CASOS DE CONTROL AL CABO DE 6 SEMANAS

	Casos de control (58)	Casos tratados (30)
	(55)	(30)
Vaginitis ·		
Trichomonas vaginalis	2	0
Monilias	1	0
Inespecíficas bacterianas	4	3
Ectropion (solo)	10	6
Cervicitis quística crónica	12	4
Erosión	39	19
		
	68	32

Como puede verse no hubo casos de vaginitis debidas a trichomonas o monilias en el grupo tratado y la frecuencia de ectropion, cervicitis quística crónica y erosiones fué menor.

La impresión de los autores es que las pacientes que emplearon el Gantrisin 'Roche' Crema Vaginal durante el post-parto tuvieron una higiene vaginal mejor, las episiotomías curaron bien y la epitelización del cérvix fué mejor que en el grupo de control. La mucosa vaginal de las pacientes tratadas se encontraba más limpia y sana que la de los controles.

La mayoría de las pacientes tratadas afirmaron que les gustaba la crema y que querían usarla en otros partos, porque observaron una marcada disminución de la leucorrea post-parto y del olor de los loquios. Frecuentemente comentaron que se sentían "más limpias".