Investigación sobre Tasas de Morbi-mortalidad Perinatal en Barrios Periféricos de la Ciudad de Ibagué

Dres. Ramiro Lozano Neira*, Héctor Mancera**,
Marina de Camacho***, Josefina de Carvajal**** y
Jorge Vargas*****

**SOCIEDAD TOLIMENSE DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA
SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA**

1. INTRODUCCION Y OBJETIVOS

El estudio, cuyos hallazgos se presentan, constituye un importante avance en el conocimiento de lo que actualmente es la situación de la madre en la ciudad de Ibagué.

Por primera vez se ha recolectado información intra-domiciliaria, casa a casa, en una muestra representativa de la población de estrato social bajo y medio.

-
- * Jefe Servicio Salud del Tolima
 - ** Jefe Sección Materno Infantil
 - *** Enfermera Jefe Sección Materno Infantil.
 - **** Directora Escuela Auxiliar de Enfermería
 - ***** Jefe Estadística

Estos datos representan los intereses aunados de la Sociedad Tolimense de Obstetricia y Ginecología y la Secretaría de Salud del Tolima.

1.1 Objetivo general

Hacer un diagnóstico de la situación actual con relación a la atención materno infantil en Ibagué, a través de la recolección y análisis de la información de las pacientes en una muestra vivienda a vivienda, teniendo en cuenta variables socio-demográficas y atención médica específica, a través de una serie de datos consignados en un formulario especial y con un criterio unificado por la Sociedad Vallecaucana de Obstetricia y Ginecología.

1.2 Objetivos Específicos

- 1.2.1 Establecer parámetros reales de la salud materno infantil por zona.
- 1.2.2 Propender por que los beneficios de los programas materno infantiles actuales y futuros se evalúen midiendo su impacto sobre la morbi-mortalidad de la comunidad.

2. DESCRIPCION SISTEMA SALUD DEL TOLIMA

El Departamento del Tolima tiene cinco Unidades Regionales, cuyos Hospitales sedes están ubicados en los Municipios de Ibagué, Armero, Espinal, Líbano y Chaparral.

2.1 Unidad Regional de Ibagué: Area de influencia

Esta Regional cuenta con siete Hospitales locales y dos Centros de Salud, su sede es el Hospital Regional "Federico Lleras Acosta" en la ciudad de Ibagué. (Anexo: No. 1).

Municipios	Habitantes:
Ibagué:	244.781
Alvarado (C.S.):	10.694
Anzoátegui:	11.450
Cajamarca:	19.768
Piedras (C.S.):	5.617
Roncesvalles:	5.617
Rovira:	26.142
Santa Isabel:	8.858
Valle de San Juan:	7.238
Venadillo:	17.500

IBAGUE: En la zona urbana de Ibagué hay 15 Centros de Salud, con servicio de consulta externa general y actividades de Enfermería. (Ver Anexo: No. 2).

De estos organismos de salud, se seleccionaron cuatro Centros de Salud para hacer el estudio y cuentan con el siguiente personal:

- UPA. Uribe Uribe: 1 Médico con 3 horas.
1 Auxiliar de Enfermería.
2 Promotoras de Salud.
- UPA. El Bosque: 1 Médico con 3 horas.
1 Auxiliar de Enfermería.
1 Promotora de Salud.
- UPA. La Gaviota: 1 Médico con 4 horas.
1 Auxiliar de Enfermería.
3 Promotoras de Salud.
- C.S. Jordán: 3 Médicos con 2 horas cada uno.
2 Auxiliares de Enfermería.
2 Odontólogos.
- C.S. Jordán II: 1 Médico con 4 horas.
1 Auxiliar de Enfermería.
1 Odontólogo.

3. MATERIAL Y METODOS

3.1 Para efectos del trabajo realizado sobre tasas de morbi-mortalidad perinatal se tomó la población de Ibagué, que es de 244.681 habitantes de acuerdo a datos estimados para 1981.

El porcentaje de habitantes para la zona urbana es de 86.03% que equivale a 210.585 habitantes.

Si tomamos un promedio de 6 habitantes por vivienda, nos da un número total de viviendas de 35.098.

De acuerdo a lo convenido en la reunión realizada en Ibagué con la Coordinadora de la investigación, se tomó un 8% del número total de viviendas que corresponde a 1.867 viviendas.

3.2 El sector que se escogió para realizar el trabajo sobre tasas de morbi-mortalidad perinatal, se distribuyó de la siguiente forma:

3.2.1 Para la selección del sector en el cual se aplicaron las encuestas casa a casa se tuvieron en cuenta las siguientes características:

3.2.1.1 Se hizo el análisis socio-económico y cultural, siendo el deseo de llevar dos sectores con características socio-económicas y culturales diferentes.

3.2.1.2 Se tuvo en cuenta en la selección del área el recurso humano disponible (Auxiliares, Ayudantes de Enfermería, etc.).

3.2.2 Los sectores escogidos de acuerdo a los parámetros anteriores son los siguientes, con sus respectivas características:

3.2.2.1 Clase Baja.

3.2.2.1.1 Barrio Uribe Uribe con 300 viviendas.

3.2.2.1.2 Barrio La Gaviota con 728 viviendas.

3.2.2.1.3 Barrio El Bosque con 459 viviendas. Para un total de 1.487 viviendas.

3.2.2.2 Clase Media

3.2.2.2.1 Barrio El Jordán con 1.321 viviendas.

3.2.2.3 Para un gran total de viviendas de 2.867.

3.2.3 Para la realización de la investigación sobre tasas de morbi-mortalidad perinatal se cuenta con el siguiente recurso humano:

3.2.3.1 Sociedad de Ginecología y Obstetricia del Tolima, representada por dos Coordinadores.

3.2.3.2 Servicio Seccional de Salud representado así: Jefe de Servicio de Salud del Tolima, Director General Hospital Regional "Federico Lleras Acosta", Jefe Sección Materno Infantil, Enfermera Jefe de la Sección Infantil, Jefe Sección Información Servicio de Salud, Enfermera Jefe de la Regional de Ibagué, Enfermera Jefe de Unidades Primarias de Salud.

3.2.3.3 Nivel Operativo

Promotores de Saneamiento Ambiental, Auxiliares de Enfermería, Ayudantes de Enfermería y Promotoras.

3.4 Características sanitarias de la población.

3.4.1 Clase Baja: (Ver Cuadro No. 1).

Cuadro que nos muestra las características desventajosas de la población de clase baja analizada, donde el 33% del total de viviendas están sin alcantarillado, 75% habitan viviendas no higiénicas, 33% no tienen inodoro y 9% tienen letrinas. Las vías de penetración están en pésimas condiciones, son sitios de botaderos de basuras y no hay recolección de basuras por parte de las Empresas Municipales. Existen zonas tuguriales

Cuadro No. 1

Barrios	alcantarillado		Acueducto	Vivienda higiénica		inodoro	
	CON	SIN		SI	NO	SI	NO
Bosque	32 %	68 %	90 %	10 %	90 %	33%	59%
Uribe Uribe	85 %	15 %	100 %	28 %	72 %	70%	20 %
La Gaviota	85 %	15 %	100 %	35 %	65 %	70%	20 %

como la Playa, en el Barrio el Bosque con 2.000 habitantes y el Barrio Uribe Uribe con 1.200 habitantes.

habitantes, con un promedio de 5.4 personas por familias (Tabla No. 1).

4. ANALISIS

4.1 Distribución número de familias por casa. Total de personas por casa (Promedio).

Se informan los resultados del estudio en 2.867 familias que corresponde al 8% de la población total de 15.412

4.2 Distribución por grupos de edad y sexo

El mayor número de personas está entre los 15 a 44 años de edad (45%), siendo predominante el número de mujeres en edad reproductiva, 3.788 (24.6%), sobre el de hombres 3.209 (20.8%), seguido por el grupo de 1 a 4 años, 6.050 (39.3%).

Tabla No. 1

Grupos de Edad	Hombres		Mujeres		Total	
	NO	%	NO	%	NO	%
< 1	233	1.5	234	1.5	467	3.0
1-14	2.973	19.3	3.077	20.0	6.050	39.5
15-44	3.209	20.8	3.788	24.6	6.997	45.4
45 y +	920	6.0	.978	6.3	1.898	12.3
Total	7.335	47.6	8.077	52.4	15.412	100.0

Total de familias: 2.867

$\bar{X}_m \times F = 5.4$

4.3. Mortalidad por grupos de edad y sexo

Tabla No. 2

Grupos de edad	Sexo		Total
	Hombres	Mujeres	
<1	51.5	21.4	36.4
1-14	1.0	1.0	1.0
15-44	3.1	0.8	1.9
45 y +	19.6	8.2	13.7
Total	5.9	2.4	4.0

La mortalidad más alta está entre los menores de un año, 36.4×1.000 , sobresaliendo el grupo de hombres, 51.5×1.000 , que muestra una relación de 2.4 a 1 (Tabla No. 2).

4.4 Mortalidad (10^3 Hab.). Por grupos de edad y sexo

En la población estudiada se encontraron 17 muertos en menores de un año,

Tabla No. 3

Grupos de edad	Sexo		Total
	Hombres	Mujeres	
<1	12	5	17
1-14	3	3	6
15-44	10	5	13
45 y +	18	8	26
Total	43	19	62

correspondiendo 12 a hombres, que es significativo en los resultados de la población mayor.

4.5 Datos de la embarazada

4.5.1 Distribución por grupo de edad.

Observamos que el mayor número de mujeres está entre los 20 a 24 años de edad, 33.2% , seguido por las de 25 a 29 años, 24.8% , encontrándose además que un 13% corresponde a las gestantes de 15 a 19 años, que es el grupo de edad calificado como de gran riesgo obstétrico. (Tabla No. 4).

Tabla No. 4

EDAD (AÑOS) GESTANTES

Edad (Años)	No.	%
15 - 19	56	13.0
20 - 24	143	33.2
25 - 29	107	24.8
30 - 34	66	15.3
35 - 39	38	8.8
40 - 44	16	3.7
45 - 49	3	0.7
50 y +	2	0.5
Total	431	100.0

Tasa embarazo (15 a 44 años)
 $= 152.3 \times 10^3$ Mujeres

Tasa general de fecundidad
 $= 107.2 \times 10^3$ Mujeres

4.5.2 Escolaridad de las gestantes

El mayor número de pacientes sólo han hecho algún año de primaria 56.8%. (Tabla No. 5).

Tabla No. 5

Escolaridad de la Gestante	No.	%
Analfabeta	38	6.9
Primaria	314	56.8
Secundaria	175	31.6
Universitaria	12	2.2
Carrera intermedia	6	1.1
Otras	8	1.4
Total	553	100.0

4.5.3 Forma de terminación del Embarazo.

Tabla No. 6

Forma de terminación del embarazo	No.	%
Normal	375	87.0
Cesárea	29	6.7
Parto prematuro	6	1.4
Aborto 1er.trimestre	16	3.7
Aborto 2o. trimestre	5	1.2
Cesárea + parto prem.		
Total	431	100.0

* 146 probable al 81 embarazos

Se observó que el 87% de los partos fueron por vía vaginal, 6.7% partos intervenidos por cesárea, además una baja incidencia de partos prematuros, 1.4%.

La relación parto-aborto es de 20 a 1, que se considera bastante baja con relación a la atención intra-hospitalaria en el Federico Lleras Acosta de Ibagué que es de 3 a 1 (Tabla No. 6).

4.6 Control prenatal

4.6.1 Lugar del control

Tabla No. 7

Lugar control prenatal.	No.	%
Centro o Puesto de Salud	153	35.4
Casa	7	1.5
Hospital	74	17.4
I.S.S.	74	17.4
Médico Particular	37	8.4
Otros	30	6.9
No asisten	56	13.0
Total	431	100.0

Se observa que el 35.4 de la población asiste a Puestos de Salud y el 17.4 al Hospital. Es de hacer notar que nuestro sistema de salud, por motivo de la sectorización de la Atención Materno Infantil, el Control Prenatal se hace en los Puestos de Salud, dejando al Hospital la atención de alto riesgo. (Tabla No. 7).

4.6.2 Por trimestre.

4.6.2.1 Gestantes sin control prenatal según trimestre de embarazo — 1980.

Tabla No. 8

Trimestre:	No. gestantes que no fueron a control	%
I	219	50.8
II	146	33.9
III	159	36.9
Nunca fueron a control	33	7.6

% Con base en 431 embarazadas

4.6.2.2 Promedio de controles prenatales - 1980.

Tabla No. 9

Trimestre:	No. gestantes que fueron a control	$\bar{X}$ Controles
I	212	1.9
II	285	2.2
III	272	2.3

De acuerdo a los resultados, las pacientes empiezan a asistir en forma más regular en el segundo y tercer trimestre del embarazo, notándose en definitiva que las pacientes que deciden continuar control prenatal lo hacen mensualmente. (Tabla No. 8 y 9).

4.6.3 Persona encargada.

Es al médico a quién le corresponde el mayor número de controles prenatales, esto se debe a que en nuestro sistema de Salud en la población de Ibagué no se delegan funciones en el personal para-

médico, además 14.2% de las pacientes embarazadas nunca acuden a ningún tipo de persona para su control, lo cual está mostrando que deben existir influencias que impiden aceptar los servicios de control prenatal, tales como situación económica, ocupación, tiempo, etc. (Tabla No. 10).

Tabla No. 10

Persona encargada Control prenatal	No.	%
Médico	307	71.2
Enfermera	12	2.8
Auxiliar	6	1.4
Partera	7	1.6
Médico y enfermera	26	6.0
Enfermera y auxiliar	1	0.2
Médico. Enferm. Aux.	5	1.2
Médico y Auxiliar	6	1.4
Nadie	61	14.2
Total	431	100.0

4.7. Complicaciones durante el Embarazo

Tabla No. 11

Complicaciones durante el embarazo	No.	%
Hemorragia vaginal	38	31.2
Infecciones severas	19	15.6
Presión alta y edema	52	42.6
H.Vaginal e Infecc. severas	3	2.4
H.Vaginal y presión alta	6	4.9
Infecc. severas, presión alta	4	3.3
Total	122	100.0

Porcentaje complicaciones = 21.1

La principal sintomatología asociada al embarazo corresponde a presión alta y edema, 42.6%, seguida de la hemorragia genital, 31.2%, y luego de las infecciones severas, 15.6%. Hay que tener en cuenta que ese porcentaje seguirá siendo alto en la medida en que asistan o no al control prenatal. (Tabla No. 11).

4.8 Datos sobre la atención parto y aborto

4.8.1 Lugar de la atención

Tabla No. 12

Lugar de Atención del parto o aborto	No.	%
Centro o Puesto de Salud	16	3.7
Casa	176	40.9
Hospital	149	34.6
I.S.S.	42	9.7
Sala maternidad	3	0.7
Clínica particular	37	8.6
Otros	8	1.8
Total	431	100.0

Se observa que el mayor número de partos son atendidos en casa, 40.9%, superando al parto hospitalario, 34.6%, lo que nos demuestra que hay varios factores que determinan que las pacientes no recurran a los servicios hospitalarios (educación — información — temor — error asistencial en el momento de la admisión de la paciente). (Tabla No. 12).

4.8.2. Persona que atendió

Relacionando los datos con el cuadro anterior, la atención del parto por parte

ra, auxiliar y enfermera es muy similar con el dato encontrado de parto atendido en casa, ya que en nuestro medio no existen los servicios de policlínica para atención del parto por personal paramédico. (Tabla No. 13).

Tabla No. 13

Persona que la atendió	No.	%
Médico	209	48.5
Enfermera	44	10.2
Auxiliar	27	6.3
Partera	131	30.4
Médico - Enfermera	7	1.5
Médico - Auxiliar	2	0.5
Otros	11	2.6
Total	431	100.0

4.8.3 Datos sobre el parto

4.8.3.1 Tipo de parto

Tabla No. 14

Tipo de parto	No.	%
Unico	402	99.1
Múltiple	4	0.9
Total	406	100.0

La Tabla No. 14 muestra que la relación del parto múltiple (gemelar) único es de 1 a 99 y está de acuerdo con las estadísticas de Estados Unidos, que siguen la proporción a la fórmula establecida por HELIN.

4.9 Complicación materna post-parto, aborto

4.9.1 Tipo de complicación

Tabla No. 15

Tipo de complicación materna	No.	%
Ninguna	325	80.0
Hemorragias durante parto o aborto	27	6.7
Hemorragias post-parto o aborto	18	4.4
Desgarros	18	4.4
Fiebre hasta 6 días	12	3.0
Muerte	1	0.3
5 - 3		
2 - 3	5	1.2
Total	406	100.0

La complicación materna más frecuente después del parto o aborto es la hemorragia.

4.9.2 Consultó después del parto o aborto.

Tabla No. 16

Consultó después del aborto o parto	No.	%
SI	137	31.8
NO	294	68.2
Total	341	100.0

Esta tabla nos muestra que el 68.2% de las pacientes que presentan parto o

aborto no asisten a control médico posterior, que hace resaltar la falta de información sobre la importancia de los servicios posnatales.

4.9.3 Lugar de la consulta

Se observa que cuando acuden a control posterior, recurren a instituciones con servicios médicos, en primer lugar al Centro o Puesto de Salud 27.5% y en segundo lugar al Hospital 20.4% (Tabla No. 17).

Tabla No. 17

Lugar de consulta pos-parto o aborto	No.	%
Centro O.P. de Salud	39	27.5
Casa	6	4.2
Hospital	29	20.4
I.S.S.	21	14.8
Sala maternidad	26	18.3
Clínica particular	21	14.8
Otros		
Total	142	100.0

4.10 Datos sobre el niño

4.10.1 Edad de gestación

Tabla No. 18

Edad gestación niño	No.	%
A término	391	95.0
7 - 8 meses	20	5.0
Total	411	100.0

La tabla que relaciona la edad gestacional del niño nos muestra que en nuestro medio la incidencia de la prematuridad es del 5%, similar a estadísticas de otros países con características socio-económicas iguales a las nuestras (Tabla No. 18).

4.10.2 Presentación

Tabla No. 19

Presentación niño	No.	%
De cabeza	389	95.8
De pelvis	14	3.5
Otra	2	0.5
Sin datos	1	0.2
Total	406	100.0

La proporción de partos en presentación de pelvis es de 3.5% en relación a todos los partos y está de acuerdo a estudios realizados en los Estados Unidos en la Universidad de GEORGETOWN. (Tabla No. 19).

4.10.3 Complicación presentada

Esta tabla nos muestra que la principal complicación del recién nacido es el síndrome de insuficiencia respiratoria, por diferentes causas tales como prematuridad, bronco-aspiración, etc. (Tabla No. 20).

4.11 El niño vive actualmente

4.11.1 Control del niño sano

Esta tabla nos indica que el 63% de los recién nacidos no son llevados a control médico. (Tabla No. 21).

Tabla No. 20

Complicación del niño	No.	%
Demora en respirar	20	4.9
Cianótico	28	6.9
Fue hospitalizado	4	1.0
Dem. resp, cianótico, hospital	8	2.0
Demora respirar, cianótico	20	4.9
Demora respirar, hospitalizado	2	0.5
Cianótico hospitalizado	2	0.5
Ninguna	316	77.8
Sin dato	6	1.5
Total	406	100.0

Tabla No. 21

Control niño sano	No.	%
SI	151	37.2
NO	255	62.8
Total	406	100.0

5. RESUMEN Y CONCLUSIONES

Se hace revisión Estadística de 2.867 familias con un promedio de 5.6 personas por familia.

Se obtuvieron las siguientes tasas de mortalidad: Mortalidad General 4 x 1.000. Mortalidad infantil 41.9 x 1.000, muy parecida a la encontrada para el Departamento del Tolima en 1980 (40 x 1.000). El porcentaje de muertes en menores de un año con respecto al total de muertes fue de 27.4. La mortalidad materna hallada fue de 2.5 x 1.000.

Se encontraron las siguientes:

Embarazo 117.2×1.000 , fecundidad general 107.2×1.000 , natalidad 20.2×1.000 , morbilidad 7.3×1.000 .

El porcentaje de mujeres en edad reproductiva (15 a 44 años) con respecto a la población total fue de 24.6%.

Las complicaciones más frecuentes del embarazo son presión alta y edema (42.6%) y hemorragia vaginal (31.2%). El porcentaje de complicaciones durante el embarazo fue de 21.1%. La condición patológica puerperal más frecuente fue la hemorragia genital.

El promedio de partos por mujer es de 2.9. Y la tasa específica de embarazo es de 152.3×1.000 .

Fue evidente que a pesar de que el mayor número de las embarazadas asistieron a uno cualquiera de los Centros para Control Prenatal, tuvieron el parto en casa, lo que revela la falta de información, remisión al Centro Hospitalario.

El número de nacidos vivos fue de 406 que da una tasa de natalidad de 26.3×1.000 . El crecimiento vegetativo de la población hallado fue de 22.3×1.000 .

6. RECOMENDACIONES

6.1 Lograr pleno aprovechamiento de los recursos disponibles, tanto humanos como institucionales; reconsiderar las asignaciones de recursos para conseguir, en forma equitativa, el gradual aumento de la cobertura de la población, excediendo al incremento progresivo de la misma.

6.2 El análisis de la encuesta presentada ofrece para el conocimiento una realidad que nos permite prever posibles situaciones futuras, condicionándolas por medio de decisiones de política que desde ahora ordenen y faciliten los cambios y transformaciones necesarias para el logro del bienestar materno-fetal.

6.3 Conseguir la participación activa de las Sociedades de Obstetricia y Pediatría en los programas relacionados con la salud materno infantil.

6.4 Activar y mejorar los programas de educación a la madre tanto en grupo como individualmente por intermedio del personal paramédico.

RESEARCH ON PERINATAL MORBIDITY AND MORTALITY RATES IN SUBURBAN SLUMS OF THE CITY OF IBAGUE

Summary and conclusions

2,867 families were studied and an average of 5.6 people per family was found.

The following mortality rates were established: General mortality: 4×1.000 . Infant mortality: 41.9×1.000 , quite similar to the rate for the whole Department of Tolima in 1980 (40×1.000). The percentage of deaths in

children below one year in relation to total deaths was 27.4. Maternal mortality was found to be 2.5×1.000 .

Other rates found were: Pregnancy: 117.2×1.000 . General fertility: 107.2×1.000 . Birth: 20.2×1.000 . Morbidity-mortality: 7.3×1.000 . The percentage of women in reproductive age (15-44) in relation to the total population was 24.6.

High blood pressure and edema are the most frequent complications during pregnancy (42.6%), followed by vaginal bleeding (31.2%). The total percentage of complications during pregnancy was found to be 21.1%. The most frequent puerperal pathology was genital bleeding.

For every women the average births are 2.9 and the specific pregnancy rate was 152.3 x 1,000.

It became evident that in spite of the fact that most pregnant women attended the antenatal care centers, they had their deliveries at home, which reflects either lack of information or lack of adequate referral to a hospital.

The number of live births was 406, which gives a birth rate of 26.3 x 1,000. Natural population growth was 22.3 x 1,000.

Bibliografía

1. R.R. PUFFER Y C.V. SERRANO, "Results of the inter-American investigations of mortality relating to reproduction". En *Epidemiology of abortion and practices of fertility regulation in latin America*; Selected reports (PAHO Publicación Científica No. 306, 1975).
2. SUSAN SCRIMSHAW ET AL, "Aceptabilidad e impacto: La evaluación en un programa modelo de prestación de servicios de salud en Cali, Colombia, Nueva York: Universidad de Columbia, Instituto Internacional para el estudio de la reproducción humana, 1975.
3. SUSAN CH. SCRIMAHAW, "La mortalidad Infantil y el comportamiento respecto a la regulación del tamaño de la familia. Estudios de población. Número especial abril de 1980 pág. 81 — 93.
4. JUAN PABLO TERRA, consultor de Unicef. "Situación de la Infancia en América Latina y el Caribe". Estudios de población número especial abril de 1980 pág. 45 — 80.
5. BEHM HUGO, material de enseñanza sobre mortalidad con especial referencia a la situación de América Latina, Celade.
6. Evaluación del programa materno infantil de Colombia 1974 — 76. Julio de 1976. Ministerio de Salud OPS, fondo de las Naciones Unidas para actividades de población.
7. Ministerio de Salud. Boletín epidemiológico nacional. Julio — septiembre 1977 Vol. 3 No. 3 — 4.