Resúmenes de la Literatura Actual

EL PROBLEMA DEL TRATAMIENTO DEL CARCINOMA MICROINVASIVO DEL CUELLO UTERINO

K. J. Lohe. Munich, República Federal Alemana. Excerpta Médica. VII Congreso Mundial de Obstetricia y Ginecología. Moscú. 1973.

Para responder a la pregunta controvertida de si el Carcinoma Microinvasivo de cuello puede ser curado con procedimientos menores que la Cirugía Radical, 419 pacientes con carcinoma microinvasivo fueron tratados y analizados en el Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Universidad de Erlangen, en Colonia y Munich.

De acuerdo a la definición de Koln, Hamperl y Kaufman, 285 casos fueron clasificados como invasión mínima al estroma y 134 como carcinomas microinvasivos. El diagnóstico histológico se basa en especímenes de conos cervicales. Rutinariamente el tejido fue estudiado en múltiples bloques.

El procedimiento terapéutico varió desde la simple conización hasta la cirugía radical con o sin irradiación. La operación de Wertheim-Weigs, Schauta Am Reich o Telinde se practicó solamente en 22% de los casos

con invasión mínima al estroma y en 49% de los casos con carcinoma microinvasivo. De los 419 pacientes tratados más de 60% fueron controladas por más de 5 años y cerca de 25% por más de 10 años. 390 pacientes viven actualmente; 7 han presentado recurrencia del tumor y de éstas 3 han muerto. 16 han muerto de enfermedades inter-recurrentes y 10 se han perdido para los controles.

Ninguna de las pacientes con invasión mínima del estroma ha muerto, 3 con carcinoma microinvasivo han fallecido.

Los resultados de este estudio indican que los procedimientos quirúrgicos radicales en pacientes con invasión mínima del estroma y en general con microcarcinoma, son innecesarios. Sin embargo en aquellos casos en que se encuentra invasión linfática se aconseja practicar histerectomía simple o modificada con disección de ganglios linfáticos.

QUIMIOTERAPIA PROFILACTICA EN LA MOLA HIDATIFORME

D. P. Goldstein, Boston, Mass, USA. Excerpta Médica. VII Congreso Mundial de Obstetricia y Ginecología. Moscú.

Se trataron profilácticamente 100 pacientes con mola, con actinomicina D con 5 dosis de 12 mg./k. por día

desde el momento de la evacuación, con el objeto de reducir la incidencia de secuelas de proliferación del

trofoblasto. Se estudió un grupo control de 100 pacientes con mola, que se evacuó y no se trató profilácticamente con actinomicina D. En todos los casos se estudió histológicamente el espécimen molar y el producto del raspado.

La posible proliferación trofoblástica se determinó por estudios seriados de gonadotrofinas séricas, utilizando Radio inmuno ensayo.

Las pacientes se controlaron semanalmente hasta obtener niveles normales de gonadotrofinas.

Se hizo seguimiento posterior mensualmente hasta 6 meses. Al término de este período de tiempo los pacientes fueron autorizados para que se embarazaran si lo deseaban. Se utilizó para contracepción en la mayoría de las pacientes durante su control, la píldora hasta el final de su control.

En el grupo tratado se observaron mínimos efectos tóxicos con la actinomicina D. consistentes en leucopenia pasajera, trombocitopenia, alopecia

ligera, estomatitis y erupción maculopapular difusa. En todos los casos a excepción de 2 la titulación de gonadotrofinas era normal a las 6 semanas. No se encontró correlación entre el grado histológico y el tiempo de regresión a la normalidad de las gonadotrofinas. Los 2 casos de enfermedad trofoblástica encontrados no fueron metastásicos.

En el grupo no tratado, se encontraron 12 casos de enfermedad trofoblástica no metastásica y 3 casos de enfermedad trofoblástica metastásica.

En estos casos se instituyó prontamente la terapéutica y se obtuvieron remisiones completas.

La regresión de las gonadotrofinas coriónicas fue más demorada en este grupo.

La quimioterapia profiláctica de la mola con Actinomicina D es una medida segura y efectiva de prevenir las metástasis y de reducir la enfermedad trofoblástica no metastásica en pacientes con mola.

CAPACITACION DEL ESPERMATOZOIDE EN EL ENDOCERVIX HUMANO

M. Roland, D. Leisten y L. Caruso. New York N.Y. USA. Excerpta Médica. VII Congreso Mundial de Obstetricia y Ginecología. 1973.

Se ha iniciado el estudio de la capacitación del espermatozoide en el endocervix humano.

Investigaciones anteriores han demostrado que la capacitación y las modificaciones bioquímicas del espermatozoide fértil ocurren en diferentes sitios del tracto genital en numerosas especies de mamíferos.

Por otra parte, la evidencia del papel que juega la capacitación en la reproducción humana no ha sido probada sino recientemente.

Este estudio incluye la administración de progestágenos sintéticos en microdosis, los cuales se ha demostrado evitan la migración del espermatozoide dentro de la cavidad uterina durante el tratamiento.

Hasta la fecha, se han estudiado 115 pacientes con este esteroide en el curso de 278 ciclos. Durante el tratamiento con esta preparación las pacientes continuaron ovulando en la mayoría de los ciclos y presentaron una morfología endometrial normal, cristalización en hebreo y secreción cervical.

La aspiración endometrial se practicó como parte del test poscoital a menudo los espermatozoides encontrados en el canal endocervical exhiben penetración al moco, viabilidad y mo-

tilidad. Se concluye que la falla en la migración transcervical de los espermatozoides se refleja en algunos cambios bioquímicos que interfieren con la capacitación del espermatozoide.

UN NUEVO METODO PARA TRATAR LA INCONTINENCIA URINARIA DE ESFUERZO

P. Bagovic, M. Bolanca, I. Pultaric y D. Milicic. Yugoslavia. Excerpta Médica. VII Congreso Mundial de Obstetricia y Ginecología. Moscú.

El deterioro de la estática del piso pélvico en la mujer se ha constituido en un complejo problema médico-social, que requiere en la mayoría de los casos corrección quirúrgica. Los datos históricos muestran numerosas variaciones en las intervenciones quirúrgicas para corregir este trastorno. Desde 1960 hemos utilizado la técnica que hoy describimos y que consiste en Histerectomía vaginal y fijación suburetral de los ligamentos redondos. El método consiste en extirpación vaginal del útero a través del fórnix posterior. El fondo de Douglas se cierra con sutura y se fija a los márgenes de la vagina. Entonces por medio de una colpografía anterior media, la uretra y el cuello de la vejiga se disecan y se hace un collar de 1-2 cms. de grueso, formado por el ado-

samiento de la fascia con puntos en x de catgut cromado.

Los ligamentos redondos se fijan uno a otro en el cuello de la vejiga y se suturan al tejido periauretral a nivel de la línea que pasa a través del orificio externo de la uretra. Se han operado 824 mujeres utilizando este método. Como regla la operación se practica en mujeres de más de 40 años. La uretroastografía se practicó siempre antes de la operación porque da útiles indicaciones sobre la necesidad de la corrección quirúrgica. El mismo método radiográfico se utiliza en el postoperatorio con buenos resultados en 98% de los casos. Nuestro método ha probado ser útil también en el tratamiento de la incontinencia de esfuerzo recurrente. El tratamiento postoperatorio incluye el drenaje vesical por 10 días.

DIAGNOSTICO TEMPRANO DE CANCER DE ENDOMETRIO

(Casuística durante un período de 10 años)

M. Bevidan y D. A. Alessandrescu, Bucaret, Rumania - VII Congreso Mundial de Obstetricia y Ginecología. Moscú.

Los aspectos morfológicos del endometrio obtenido por curetaje uterino, han sido estudiados en todas las pacientes de 38 y más años que presentaban menometrorragia y hospitalizadas durante el período de tiempo comprendido entre 1962 y

1971. De un total de 4.595 casos, se encontró una incidencia de 3,29% de tumores malignos y 17,3% de hiperplasias considerados como estados precancerosos del carcinoma endometrial.

Los autores insisten en la posibili-

dad de la degeneración maligna de la hiperplasia dependiendo del patrón histológico y de una serie de factores de riesgo tales como edad, paridad, períodos fisiológicos, enfermedades asociadas como la diabetes y la hipertensión.

Los carcinomas del endometrio se observaron en el período premenopáusicos en 24% de los casos. Invasión miometrial se presentó en 27%. Invasión a los anexos en 6,6%; metás-

tasis en ganglios linfáticos en 4% y diseminación peritoneal en 1,2%. El cuadro histológico dominante fue el adenocarcinoma.

Los carcinomas limitados al endometrio o con mínima invasión miometrial, fueron considerados como de diagnóstico relativamente temprano si se tiene en cuenta el comportamiento del tumor (evolución local lenta, metástasis tardías).

ENDOAMNIOSCOPIA Y BIOPSIA FETAL PARA DIAGNOSTICO PRENATAL GENETICO

C. Valenti, Brooklyn, N.Y. USA. Excerpta Médica - VII Congreso Mundial de Obstetricia y Ginecología. Moscú.

La eficiencia de la amniocentesis en la detección prenatal de condiciones hereditarias está limitada por el origen incierto de las células del líquido amniótico y el intervalo prolongado de tiempo entre la amniocentesis y el crecimiento de los cultivos celulares. La mayoría de defectos hereditarios escapa a la detección in útero debido a la ausencia de diagnóstico morfológico y de hallazgos bioquímicos en los fibroblastos cultivados (ejemplo: anemias hereditarias). Se ha desarrollado una técnica en este laboratorio para visualizar el feto y hacer biopsia en la semana 14 de amenorrea. 15 pacientes sometidos a histerectomía para practicar aborto entre la 14ª y 18ª semana de acuerdo a la ley de N. Y. S., se les practicó endoamnioscopia, en el momento de la cirugía, prece-

dida de placentografía por somar.

Todas las partes fetales fueron claramente identificadas y se obtuvieron biopsias de piel de 2 a 3 mm. en 8 fetos los cuales se les analizó su contenido enzimático inmediatamente y posteriormente en los cultivos; no se apreció hemorragia en el sitio de la biopsia. Las células crecieron satisfactoriamente y se efectuaron estudios bioquímicos con resultados a los 5 días de practicada la endoamnioscopia.

Se obtuvieron muestras de sangre del cordón en 3 casos para análisis bioquímico y citogenético. La seguridad de la amnioscopia se probó en monas RHesas embarazadas y en pacientes a las cuales se les practicó histerectomía.

LIPIDOS EN LA TOXEMIA GRAVIDICA

F. Jaisle, República Federal Alemana. Excerpta Médica. VII Congreso Mundial de Obstetricia y Ginecología.

Las causas de la toxemia, son hasta ahora desconocidas. Hay gran número de hipótesis y una extensa literatura sobre la génesis de esta enfermedad. Se sabe que la toxemia es no solamente una enfermedad renal sino una alteración total metabólica.

Uno de los prerequisites para esta enfermedad es la existencia de una condición similar a la de la mola hidatiforme.

Se han descrito cambios en el metabolismo de los lípidos durante la toxemia. Kotasek y colaboradores, muestran la existencia de una relación directa entre la toxemia, la dihidro epiandrosterona y los niveles de B- lipoproteínas en el suero e intentan incluir la determinación de B- lipoproteínas en el diagnóstico de la toxemia. Altos niveles se encontrarían en épocas tempranas y nos pondrían alertas con estas pacientes.

Denbner ha comparado 41 mujeres en buen estado de salud, con 45 pacientes con toxemia, todas en los últimos períodos del embarazo y ha investigado los lípidos totales en suero, el colesterol, los ácidos grasos esterificados o no.

Los niveles de lípidos totales y colesterol en pacientes con toxemia se encontraron ligeramente aumentados. Los cambios en las concentraciones de los ácidos grasos no esterificados en las pacientes toxémicas comparados con los controles, fueron insignificantes.

En contraste con esto, los niveles de B- lipoproteínas y de ácidos grasos esterificados, en pacientes con preeclampsia fueron muy elevados.

Los ácidos grasos esterificados aumentaron ligeramente en la toxemia moderada, pero en los casos de toxemia severa mostraron un aumento bastante elevado.

Las pacientes toxémicas se dividieron en 12 grupos para este estudio, y al final se llegó a la conclusión de que la severidad de la toxemia puede ser graduada de acuerdo a las concentraciones de los ácidos grasos esterificados, así:

1) Toxemia leve, cerca de 500 mg. %.

2) Toxemia de mediana gravedad, 500-600 mg. %.

3) Toxemia severa. Por encima de 600 mg. %.

METODOS PARA REDUCIR LA PERDIDA DE SANGRE EN EL TERCER PERIODO DEL PARTO Y EN EL POSTPARTUM

I. Semeshi, L. Zubek y L. Sani, Budapest, Hungría. Excerpta Médica. VII Congreso Mundial de Obstetricia y Ginecología.

Los autores estudian el problema de la hemorragia en el tercer período del parto y en el postparto y

plantean algunas conductas que consideran apropiadas.

Uno de los estados que causan he-

morragia postparto con gran frecuencia son los trabajos prolongados con atonía uterina en el postpartum inmediato.

Los autores establecieron el promedio de pérdida sanguínea en la operación cesárea que fue de 283,3 ml.; pérdidas superiores a 500 ml. solo se observaron en un 0,77%.

Los autores proponen para reducir la hemorragia del alumbramiento la aplicación de 10 unidades de

oxitocina por vía intravenosa y la extracción de la placenta traccionando el cordón.

Con esta técnica el promedio de la pérdida sanguínea se redujo durante el alumbramiento. En 84,6% de 3.500 casos la placenta se extrajo en menos de 1 minuto y el promedio de la pérdida sanguínea fue de 78,9 ml. En 3.500 casos al pérdida sanguínea fue de 81,3 ml. Hemorragias superiores a 500 ml. solo se observaron en 6 casos que equivalen a 0,17%.

CIRUGIA CONSERVADORA EN EL EMBARAZO ECTOPICO

Stromme, W. B. (Univ. of Minnesota Medical School, Minneapolis, Minn. 55455). Obstet. Gynec. 41: 215-223, 1973.

La cirugía del embarazo ectópico no debe ser necesariamente extirpadora.

El diagnóstico temprano basado en la historia clínica, los hallazgos pélvicos y los exámenes paraclínicos, permiten la intervención quirúrgica antes de que ocurra la ruptura. La paciente va a cirugía en relativas buenas condiciones; su postoperatorio cursa sin complicaciones. La salpingotomía y otros procedimientos operatorios permiten la preservación de la función.

En una revisión de 141 pacientes con embarazos ectópicos durante 20

años, se encontró que se había hecho cirugía conservativa en 24% de los casos en los 10 primeros años y 53% en la pasada década.

El embarazo ectópico recurrió en 7 pacientes (todos en la serie de los 10 últimos años), que habían tenido cirugía conservativa; 4 en la misma trompa y 3 en la trompa contralateral.

En este período de 20 años con cirugía conservativa en el embarazo ectópico, 30 pacientes tuvieron embarazos posteriores, con 32 partos con feto viable.