

Bonstein, I.,
Kaufmann, R.,
Geneva:
La psychanalgesie par le
Valium intraveineux.
Méd. et Hyg. (Geneve)
29, 431: 1971

M. G. GINE — La psicoanalgesia con Valium 'Roche' ampollas permite al médico general y al especialista hacer cirugía de urgencia en intervenciones para las cuales antes era necesaria la anestesia general. Valium no produce los efectos secundarios de los barbitúricos.

PSYCHOANALGESIA WITH 'VALIUM' 'ROCHE'
LA PSICOANALGESIS CON 'VALIUM' 'ROCHE'

La psicoanalgesia con Valium Roche es una nueva técnica que permite al médico general o al especialista por sí mismo, entenderse con las llamadas de emergencia para intervenciones quirúrgicas para las cuales hubiera sido previamente necesaria la anestesia general.

BONSTEIN y KAUFMANN usaron 'Valium' 'Roche' como sustituto para un anestésico, pero en realidad no induce narcosis o anestesia general; el paciente permanece usualmente despierto o duerme solo superficialmente. Por virtud de su acción en el sistema límbico el 'Valium' 'Roche' tiende a suprimir la integración emocional y a memorizar las experiencias dolorosas. Todavía ocurren las reacciones físicas y mímicas al dolor, pero en forma mucho más suave. Un factor adicional es subsecuente: la amnesia lagunar de una naturaleza duradera.

La acción miorelajante del 'Valium' 'Roche' facilita la cirugía. Los barbitúricos normalmente empleados para la anestesia actúan en conjunto sobre el sistema nervioso central y reducen el grado de los centros circulatorio vital y respiratorio. Como el vómito es un frecuente efecto secundario de estas drogas es necesaria la supervisión médica cuando el paciente vuelve en sí. En la experiencia de los autores, la psicoanalgesia con 'Valium' 'Roche' no produce náusea ni vómito. La eventualidad posterior no sería peligrosa en ningún caso, puesto que los reflejos del paciente permanecen intactos.

Los autores describen sus experiencias con 'Valium' 'Roche' en 114 pacientes. Los procedimientos quirúrgicos intentados fueron los siguientes:

Curetaje	72
Extirpación manual de la placenta, exámenes uterinos	15
Inserción IUD (insertion of intra-uterine divices)	8
Diagnósticos varios e intervenciones terapéuticas	19
Se obtuvieron los siguientes resultados:	
Excelente	72 casos
Bueno	20 "
Regular	17 "
Malo	2 "
	<hr/>
	114 casos

La amnesia ocurrió en todos los 114 pacientes.

Los resultados se clasificaron como regulares cuando hubo necesidad de administrar barbitúricos o cuando la conmoción volvió la intervención difícil. Se clasificaron como 'malos' cuando fue necesaria la propia anestesia.

La Psicoanalgesia con 'Valium' 'Roche' intravenoso estuvo acompañada por premedicación con 0.25 a 0.5 mg. de atropina sulfato cerca de 30 minutos antes de la cirugía. Se descubrió que la inyección de 10 mg. de 'Valium' 'Roche' reducía grandemente la anestesia preoperatoria. Se aplicaron lentamente por vía intravenosa 20 mg. y ocasionalmente de 30 a 40 mg.

Las conclusiones del autor fueron: 'creemos que este método es particularmente valioso para casos muy urgentes y para los doctores que trabajan solos. A condición de que solo se tengan cortos procedimientos quirúrgicos (e. g. dilatación y curetaje) los usamos en cualquier emergencia donde no sabemos si el paciente ha comido o no. En nuestra opinión, la psicoanalgesia con el Valium Roche intravenoso constituye el método de escogencia para la extirpación normal de la placenta, extirpación de absceso y exámenes del útero y la cervix. Posteriormente facilita grandemente la inserción del dispositivo intra-uterino y la histeroscápingografía'.