LA C. R. P. (C. reactiv protein) COMO AUXILIAR DIAGNOSTICO EN LAS APENDICOPATIAS E INFECCIONES ANEXIALES

Doctor Alberto Aparicio Rueda (*)

El autor del trabajo hace un amplio análisis del test denominado C. R. P. (C. reactiv protein), en las apendicopatías e infecciones anexiales y lo compara con otros auxiliares de laboratorio como la fórmula leucocitaria y la sedimentación globular.

Su estudio lo enfocó como se puede apreciar en el título a un reducido grupo de enfermedades en donde el test tiene aplicaciones, para poder obtener un mayor número de observaciones.

Queremos comentar solamente en este resumen el valor del C. R. P. en los estados infecciosos salpingianos, los cuales fueron controlados clínicamente y con determinaciones de velocidad de sedimentación y fórmula blanca.

En todos los casos correctamente diagnosticados de anexitis se practicó la reacción con resultados francamente positivos y la positividad fue por una parte más intensa y por otra más precoz que la sedimentación globular y la fórmula leucocitaria. Es interesante también anotar que cuando los dos últimos test se habían normalizado, el C. R. P. continuaba débilmente positivo por un tiempo mayor.

Anota Aparicio la correlación de los resultados de los tres auxiliares diagnósticos, pero hace resaltar la precocidad del C. R. P. y la demora en negativizarse y la preconiza en esta forma como un poderoso auxiliar de laboratorio en el diagnóstico de las anexitis, en el control de su tratamiento y como juicio para un recto criterio de curación en los casos de tratamiento médico.

R. R. G.

(*) Resumen de tesis de grado.