SERVICIO CIENTIFICO

SIBOULET, A. Hospital San Luis Instituto Alfred Fournier, Francia Urología, M. G. 93% de curaciones en uretritis gonocócicas masculinas, 78.3% en femeninas con 8 comprimidos de Bactrim. Por no ser activo contra el treponema pallidum, no se corre el riesgo de enmascarar una sífilis en evolución.

INFECTIONS GENITALES MICROBIENNES GONOCOCCIQUES OU NON

Gaz. Méd. France 78, 27: 4440-44, (1971)

"Bactrim" en infecciones genitales microbianas gonocócicas o no.

En vista de la sorprendente recrudescencia que en muchos países han adquirido las infecciones urogenitales transmisibles, el autor estudió la acción del Bactrim* Roche en varias de ellas, o sea:

- Uretritis gonocócicas masculinas, 143 + 26 casos;
- síndromes urogenitales gonocócicos femeninos, 23 casos;
- síndromes urogenitales masculinos por diversos gérmenes piógenos con excepción de los Neisseria gonorrhoeae estafilococos, proteus, enterococos, etc.) 23 casos.

El tratamiento consistió, en la mayoría de los casos, especialmente en la uretritis aguda de reciente contaminación, en la toma de 8 comprimidos de Bactrim: 4 con un primer vaso de agua y otros 4 con un segundo vaso de agua (143 casos masculinos tratados y 23 casos femeninos).

En ciertos enfermos con síndromes urogenitales en evolución desde hacía algún tiempo, el tratamiento consistió en la toma de una vez de 8 comprimidos, seguida de otra igual a las 24 horas (26 casos masculinos tratados).

En las uretritis microbianas, salvo por Neisseria, la dosis fue de 4 comprimidos diarios, dos por la mañana antes del desayuno y dos por la noche antes de la cena, durante 10 días seguidos (23 casos masculinos tratados).

Los resultados obtenidos con 8 comprimidos de Bactrim fueron excelentes, pues se logró la curación a las veinticuatro horas, sin que se comprobara uretritis subaguda residual. Los resultados son mejores en el hombre, con 93% de curaciones, que en la mujer, donde, sin embargo fueron satis-

^{*} Marca de Fábrica.

factorios. Si después de este tratamiento, persiste secreción uretral con irritación del meato, el autor prescribe una segunda dosis de 8 comprimidos a la vez, 24 horas más tarde. Aconseja este tratamiento sobre todo en casos de etiología mixta, por ejemplo en la asociación de Neisseria gonocócica y gérmenes piógenos patógenos. Así ha obtenido 24 curaciones en 26 enfermos masculinos.

En resumen, Siboulet declara que por ser el Bactrim rápidamente eficaz en el tratamiento de las infecciones gonocócicas, responde a las exigencias epidemiológicas actuales. Obtuvo en 169 casos masculinos tratados, 157 resultados favorables inmediatos y definitivos, y 18 éxitos en 23 casos femeninos. Además, por el hecho de no ser activo contra el treponema pallidum, no se corre el riesgo de enmascarar una sífilis en evolución. Todo esto lleva a proponer el Bactrim en el tratamiento de las infecciones urogenitales gonocócicas o por gérmenes piógenos diversos.