LACOSTE, J.
PAGE, G.
QUINOT, B.
Hospital Militar de Instrucción
Mohamed V.
Rabat, Marruecos

M.I., M.G. En 124 tratamientos de diversas infecciones sólo se registraron dos fracasos. Gran eficacia del Bactrim en: Salmonelosis, Shigelosis, Meningitis purulenta, Infecciones urinarias, Infecciones broncopulmonares, Infecciones cutáneas. Excelente tolerancia.

L'ASSOCIATION SULFAMETHOXAZOLE-TRIMETHOPRIME EN PATHOLOGIE INFECTIEUSE

Thérapeutique, 47, 9: 853-55 (1971)

Bactrim en patología infecciosa

Lacoste y colaboradores hicieron un estudio detallado con Bactrim* Roche en 124 enfermos de diversas infecciones, cuya clasificación, posología adoptada y resultados, son como sigue:

49 salmonelosis. Se trataba en la mayoría de los casos de adultos jóvenes, de 20 a 31 años, y en 6, de niños de 10 a 14 años. Del total, 42 enfermos presentaban formas de mediana gravedad y 7 más severas. Se comenzó el tratamiento con Bactrim el décimo día de enfermedad, y en 10 casos al decimoquinto, administrando 4 comprimidos a los adultos y 2 comprimidos a los niños (peso promedio inferior a 35 kg.). La duración del mismo fue en general de 14 días, o sea, en media, 8 días después de obtener la apirexia y se prolongó a 17-20 días sólo en 5 casos. Los resultados clínicos pueden clasificarse de excelentes y no hubo fracaso alguno. Buena tolerancia.

9 shigelosis. Por disentería bacilar fueron tratados 8 adultos y un niño de 10 años. En 5 casos se trataba de formas graves con más de 15 deposiciones diarias y repercusión sobre el estado general. El germen causante era *Shigella Flexneri* en 7 casos y *Shigella Sonnei* en los otros dos. Los adultos tomaron 4 comprimidos al día, dos cada doce horas, y la mitad el niño, durante 10 días. La evolución fue siempre rápidamente favorable. No se registró incidente alguno.

8 meningitis purulenta. En 7 casos se trataba de meningitis por meningococos y en 1 de meningitis purulenta post-otítica, cuyo germen no fue aislado. En 4 observaciones, se trató a los pacientes con Bactrim sólo a la dosis de 4 a 6 comprimidos diarios durante 15-20 días. En este grupo la mejoría fue sensible, quedando los enfermos apiréticos entre el 3º y 8º día.

En un caso, el Bactrim, a la dosis de 4 comprimidos diarios, en dos tomas, durante 15 días, fue asociado a 4.000.000 U. diarias de penicilina. La evolución fue rápidamente favorable. Hubo dos fracasos en que el germen

* Marca de Fábrica

demostró resistencia in vitro al Bactrim. No se registró incidente alguno de tolerancia.

14 infecciones urinarias. Se trataba de infecciones graves en enfermos diabéticos, otros parapléjicos, algunos con pielonefritis y uno con orquiepididimitis. Se aislaron los siguientes gérmenes: *Escherichia coli*, *Klebsiella*, *Proteus mirabilis*, *Pseudomonas aeruginosa*. La mayoría de estos pacientes fueron tratados con dosis de 4 comprimidos —algunos 6 comprimidos— al día durante un promedio de 12 días. En todos ellos los resultados clínicos y bacteriológicos fueron excelentes y no se observaron reacciones secundarias.

34 infecciones broncopulmonares. Clínicamente manifestadas como pneumopatías agudas, neumonía lobar por pneumococos, sobreinfección bronquial en bronquíticos crónicos, asmáticos, portadores de bronquiectasias o de abscesos del pulmón. Se trató a todos los pacientes, salvo a tres de pneumopatía, con sólo Bactrim; pero a estos tres últimos hubo que añadir penicilina por la gravedad de los síntomas iniciales. La dosis de Bactrim fue de 4 comprimidos diarias durante una media de 10 días. En el absceso pulmonar se administró una dosis diaria de 6 comprimidos la primera quincena, seguida de 4 comprimidos diarios hasta 35 días. En todos los casos la evolución fue satisfactoria. En uno sólo se presentó eosinofilia al cabo de 15 días de tratamiento, la cual desapareció rápidamente.

6 infecciones cutáneas. Tres de estos enfermos presentaban una piodermitis severa y otro una sicosis sobreinfectada, las que desaparecieron con la dosis corriente de Bactrim, en 10 a 15 días.

6 diversos. Se trataron con Bactrim, obteniendo resultados muy satisfactorios: una pústula carbuncosa (4 comprimidos durante 15 días), una leptospirosis íctero-hemorrágica (4 comprimidos durante 18 días) y 4 uretritis gonocócicas, de las cuales dos con orquiepididimitis. Los autores hacen referencia a otros trabajos en que se empleó una dosis única de 8 comprimidos de Bactrim.

Lacoste y colaboradores señalan en conclusión de este trabajo la grandísima eficacia del Bactrim y su excelente tolerancia. En las 124 observaciones sólo registraron 2 fracasos. No se presentaron trastornos gastrointestinales ni reacciones cutáneas. En el cuadro hematológico hubo que anotar dos casos transitorios de eosinofilia y dos de neutropenia, rápidamente regresivos.