INFORME WHO/OMS – 1988 (FIGO)
SITUACION MUNDIAL SOBRE SIDA
Actualización, Marzo de 1988

El número de casos de SIDA reconocidos y de países informando sobre el SIDA ha continuado creciendo en forma dramática. Hasta fines de febrero de 1988 se han informado oficialmente 81.433 casos de SIDA a la Organización Mundial de la Salud (OMS), provenientes de 133 países; sin embargo, este número representa sólo una fracción del total de casos de SIDA a la fecha, estimado aproximadamente en 150.000.

La OMS estima que pueden estar actualmente infectados entre 5 y 10 millones de personas con el virus de inmunodeficiencia humano, o HIV, el virus causante del SIDA. Para 1991, la OMS estima en al menos un millón los nuevos casos de SIDA que pueden desarrollarse en la población actualmente infectada con HIV.

El SIDA ha sido encontrado en todo el mundo, el mayor número de casos 53.059, en Estados Unidos, donde fue diagnosticado por primera vez en 1981; en otros 41 países de América, se han informado un total de 7.340 casos. En América, Europa y Australia, muchos casos de SIDA afectan a jóvenes, entre las edades de 20 y 49 años en hombres homosexuales o bisexuales y adictos al uso de drogas endovenosas; sin embargo, la proporción estimada de casos de SIDA adquiridos a través de contactos heterosexuales ha crecido del 1% al 4%. El Servicio de Salud Pública de Estados Unidos estima que en dicho país, en el año de 1991 habrán ocurrido 270.000 casos de SIDA, cerca de cinco veces el número total de casos informados mundialmente hasta ahora.

En Europa, donde 27 países han informado 10.177 casos de SIDA, muchos de ellos consideran que actualmente enfrentan una epidemia. La OMS estima que entre 500.000 y un millón de personas en Europa están infestadas con el virus del SIDA. Los mayores porcentajes por millón de habitantes se encuentran en Suiza, Francia y Dinamarca. La OMS estima en 25.000 los nuevos casos de SIDA en Europa para fines de 1988.

En Africa, ha aumentado considerablemente el número de países que han informado casos de SIDA a la OMS durante el pasado año; para fines de febrero de 1988, 41 naciones africanas habían informado 9.788 casos de SIDA.

Los factores más importantes para la difusión del HIV en Africa son: La transmisión heterosexual, las transfusiones de sangre no estudiada, el uso de agujas o jeringas sin esterilizar y la transmisión de madre a hijo; ésta última es una importante fuente de infección, especialmente en áreas donde el 5.10% de las mujeres embarazadas son HIV seropositivas.

En Asia, 19 países han informado 233 casos de SIDA; muchos de esos casos están relacionados con personas que han estado en zonas donde el SIDA es más prevalente. Oceanía (incluyendo Australia y Nueva Zelandia) ha informado 826 casos.

Pese a la numerosa investigación, una vacuna parece más lejana que lo pensado hace un año; además,aún no existe curación para el SIDA. En ausencia de una vacuna o tratamiento curativo efectivo, sólo la educación y la información para evitar el SIDA, constituyen la llave para controlar su difusión.