Transfusión Intravascular Intrauterina en Isoinmunización RH

PRESENTACION DE UN CASO

Dres.: Eduardo Ortiz Herrera*, Eduardo Acosta Lleras**, Eduardo Acosta Cajiao***

TRANSFUSION INTRAUTERINA

A pesar del ampliamente conocido método de prevenir la isoinmunización por Rh, por medio de la inyección oportuna del anti D (rhesuman), aún se presenta un escaso número de mujeres con el problema de este tipo de isoinmunización (1).

La isoinmunización puede ocurrir si no se suministra a tiempo el Anti-D a las pacientes, después de un parto, aborto, ectópico, una amniocentesis, o que hayan recibido una transfusión de sangre incompatible.

El manejo de los casos con isoinmunización severa, se ha intentado resolver con Plasmaféresis materna a repetición durante el embarazo, pero éste método ha demostrado ser costoso y con poco éxito (5). La transfusión intrauterina reportada por primera vez por Liley en 1963 (1), se ha convertido en un método adecuado y aceptado en los centros perinatales, para tratar al feto inmaduro con enfermedad hemolítica severa (2, 4).

El método empleado por Liley y sus seguidores, es el de transfundir glóbulos rojos empaquetados al feto intraperitonealmente. Este método ha tenido relativo éxito.

Más recientemente, se han utilizado técnicas fetoscópicas para llegar a la vena umbilical en el sitio de inserción placentaria del cordón umbilical, bajo visión directa, por lo tanto permitiendo una transfusión intravascular directa con sangre Rh ne-

gativa (6). Esta técnica se torna más difícil después de la semana 30, porque aumenta la relación del tamaño fetal versus el volumen del líquido, y también porque el líquido amniótico se torna opaco. La fetoscopia además requiere anestesia y al introducir un fetoscopio de gran calibre en el útero grávido, se corre un gran riesgo (7).

Posteriormente Bang. y Cols., reportan por primera vez y con éxito, la técnica de transfusión Intrauterina Intravascular, en fetos severamente isoinmunizados, bajo visualización directa con ultrasonido (8).

Presentación del Caso

Presentamos nuestra primera experiencia de Transfusión Intrauterina Intravascular de un feto severamente comprometido por isoinmunización Rh. El procedimiento se realizó en la Clínica del Country. Paciente de 33 años G3, P2, AO, quien se presentó a consulta por primera vez el 15 de enero de 1988, con 11 semanas de gestación, lo cual se confirmó con una ecografía. La paciente de grupo O Rh negativo y el esposo grupo O RH positivo. La historia obstétrica mostró lo siguiente:

En 1977 tuvo un parto vaginal normal, el producto, un recién nacido sano de sexo masculino, con Rh positivo. La madre nunca recibió el anti D (Rhesuman).

En 1985, tuvo otro parto vaginal normal a término. El producto, un recién nacido de sexo femenino Rh positivo, severamente isoinmunizado, que murió durante una exanguino-transfusión.

El embarazo actual fue de curso normal, excepto por la isoinmunización Rh, que se evidenció

* Director Instituto ARGO

** Ginecólogo y obstetra. Práctica privada

*** Ginecólogo y obstetra. Hospital Central de la Policía Nacional

por los títulos de Coombs indirectos (ver Tabla 1), y por el resultado de las amniocentesis seriadas que se hicieron para determinar el grado de hemólisis fetal (ver Tabla 2), mediante el análisis espectrofotométrico del líquido amniótico para la concentración de bilirrubina.

TABLA 1

Fecha	Edad Gestacional	Título de Coombs
Enero 8-88	11.5	1/16
Marzo 17-88	19.0	1/32
Abril 4-88	21.5	1/64
Abril 18-88	23.5	1/256

TABLA 2

Fecha	Edad Gestacional	DO 450	L/S
Abril 22-88	23.5	0.24	—
Abril 29-88	24.5	0.25	—
Mayo 11-88	26.0	0.25	—
Mayo 25-88	28.0	0.18	—
Junio 10-88	30.0	0.18	1.5

Una ecografía practicada a las 30 semanas de gestación, mostró un feto con evidencia de ascitis moderada, edema subcutáneo, la placenta francamente hipetrófica (9). Ver foto No. 1. El perfil biofísico fetal dio un puntaje de 6, es decir, una hipoactividad fetal como consecuencia de una hipoxia.

A esta edad gestacional se inyectó betametasona para inducir maduración pulmonar fetal.

Al analizar la curva de Liley (ver Figura 1), observamos que estábamos muy cerca de la zona III, hallazgo que sumado al de la ecografía y el Perfil Biofísico Fetal, nos llevó a la conclusión de que estábamos frente a un caso de un feto severamente hemolizado, con un riesgo extraordinario de morir in-útero y con inmadurez pulmonar. Por lo tanto, decidimos realizar una Transfusión Intrauterina Intravascular.

Técnica

La víspera del tratamiento se realizó una ecografía completa, con biometría fetal cuidadosa y con énfasis especial en la identificación y localización de la inserción del cordón en la placenta (Fo-

La punta de flecha con VU, indica la entrada de la vena umbilical en el sitio de la inserción placentaria del cordón umbilical. La punta de flecha con PL, indica la placenta exagradamente hipetrófica.

to No. 1). El día de la intervención, la paciente fue hospitalizada, e inmediatamente antes de ser llevada a la sala de cirugía, se le tomó una muestra de sangre para determinar la Hemoglobina, el Hematocrito y el Volumen Corpuscular medio, con el objeto de tenerlos como referencia para compararlos con los obtenidos en la muestra fetal.

FIGURA 1

CURVA DE LILEY. Las determinaciones de la concentración de bilirrubina, muestra que estábamos muy cerca de la zona 3.

Media hora antes del procedimiento, se le aplicaron 50 mg de Meperidina por vía IM, y en el momento de cubrir a la paciente con los campos estériles, se le aplicaron por vía IV 10 mg de Diazepán, 2.5 mg de Terbutalina y 1 g de Ampicilina. Una vez preparado el abdomen de la paciente, utilizando un equipo de ultrasonido de tiempo real de alta resolución con un transductor lineal de 3.5 MHz (Sonoline SL-Siemens), se localizó la inserción del cordón en la placenta. Bajo visión ecográfica directa, se procedió a puncionar la vena umbilical aproximadamente a 2 cm de la raíz del cordón, utilizando una aguja calibre 22 de 15 cm. (Tipo Chiba); este objetivo se logró al segundo intento (Foto No. 2). Una vez insertada la aguja se obtuvo una muestra de sangre de 1 ml que fue enviada al laboratorio para análisis, encontrándose: Hemoglobina 6.0% Hematocrito 18, Volumen Corpuscular medio 130, y RH Positivo (después del lavado de los glóbulos rojos). Confirmando por el V.C.M., y por el Rh, que se trataba de sangre fetal, se procedió a la inyección de

Pequeña equimosis (punta de flecha) en la gelatina de Wharton de la raíz del cordón umbilical.

10 ml de glóbulos rojos empaquetados, después de lo cual se tomó una nueva muestra para controlar la Hemoglobina y Hematocrito, pero durante la maniobra se desalojó la punta de la aguja, lo que obligó a relocalizarla para la inyección de los 8 ml restantes, inyectándose un total de 18 ml.

Al finalizar la transfusión, la F.C.F. estaba en 160 lt/min. y se observó un pequeño hematoma en la raíz del cordón, el cual se resolvió espontáneamente en 48 horas.

La paciente fue controlada con perfil biofísico tres veces por semana. Diez días después de la transfusión y una vez documentada la madurez pulmonar fetal por determinación de fosfatidil glicerol, se practicó una cesárea electiva obteniéndose un feto femenino de 1900 gm de peso, con una hemoglobina en sangre de cordón de 5.7% que requirió 4 exanguinotransfusiones y fue dado de alta a los 10 días, luego de haber evolucionado en forma satisfactoria.

Al examen macroscópico de la placenta se observó una pequeña equimosis en la raíz del cordón, y una marca puntiforme en la gelatina de Wharton, la cual probablemente correspondía al sitio de la punción (Foto No. 3).

DISCUSION

Para que un procedimiento sea aceptado en la práctica clínica rutinaria, debe demostrar que sus beneficios superan las potenciales complicaciones. Aunque tan recientemente como en octubre de 1983, médicos de la autoridad del Dr. John

Se observa la localización de la aguja (punta de flecha), en la inserción placentaria del cordón. P: Placenta; VU: Vena Umbilical.

Bowman desaconsejaban las técnicas de transfusión intrauterina intravascular (20), el transcurso de estos pocos años ha puesto de manifiesto las ventajas de esta técnica.

Desde la descripción hecha por Liley (10), la técnica de transfusión intrauterina había sufrido pocas y poco trascendentes modificaciones, y seguía representando un riesgo grande para el feto (11, 12). Sin embargo, la utilización de la ecografía como ayuda técnica en la realización del procedimiento (4, 13, 14, 15, 16), permitió a los grupos con mayor experiencia como el de Winnipeg, disminuir a 0 la mortalidad asociada directamente con trauma fetal, y obtener una supervivencia del 100% en fetos no hidróticos y del 75% en fetos hidróticos (4). A pesar de esto, la transfusión intravascular puede tener varias ventajas:

- 1o. Disminuye el riesgo de trauma que representa la inserción de la aguja de transfusión en el abdomen fetal (11, 12).
- 2o. Los fetos hidróticos pueden estar demasiado enfermos para absorber por vía linfática los glóbulos rojos depositados exitosamente en la cavidad peritoneal (17, 19, 23).
- 3o. El acceso intravascular permite realizar la transfusión entre 4 y 6 semanas más temprano que por vía intraperitoneal, obteniendo así un 80% de supervivencia en los fetos menores de 25 semanas (17).
- 4o. La transfusión intravascular, permite establecer la hemoclasificación fetal y evitar así transfusiones innecesarias; permite también determinar la hemoglobina y el hematocrito fetales, tanto pre como post transfusionales, facilitando el cálculo de la cantidad de sangre que debe transfundirse y permitiendo establecer la efectividad de la transfusión (6, 17, 19, 22).
- 5o. La determinación de la Hemoglobina y Hematocrito fetales durante el 2o. trimestre, permiten evaluar la severidad de la enfermedad fetal en forma más precisa que la curva de Liley (24).

Las primeras transfusiones intravasculares utilizando técnica fetoscópica, fueron reportadas por Rodeck en 1981. Aunque los resultados reportados son bastante buenos (6, 17), la fetoscopia, como ya anotamos, no deja de presentar algunos inconvenientes:

- 1o. La técnica no es fácil y se requiere la amplia experiencia de Rodeck y sus colaboradores para lograr la cateterización de los vasos umbilicales; por lo tanto, es poco probable que en otros centros logren reproducirse sus excelentes resultados (23).
- 2o. La relación volumen amniótico/volumen fetal, disminuye a medida que progresa el embarazo, al tiempo que el líquido amniótico se va haciendo progresivamente turbio, especialmente cuando están aumentadas las bilirrubinas y demás pigmentos derivados de la hemoglobina (18, 23, 25), lo cual dificulta considerablemente la fetoscopia alrededor de 30 semanas.
- 3o. La fetoscopia se asocia con un bajo pero significativo porcentaje de pérdidas fetales que oscila entre el 2 y el 5% según los distintos autores (22, 27, 28, 26, 29).

El acceso percutáneo al sistema vascular fetal bajo control ecográfico, fue descrito inicialmente por Daffos, quien obtuvo sangre fetal para pruebas diagnósticas utilizando una aguja calibre 20 (28). En la revisión más numerosa de casos (25), este procedimiento se asoció solamente con un 1.1% y 0.8% de pérdidas fetales y abortos respectivamente. La posibilidad de usar la punción del cordón umbilical, como procedimiento terapéutico, también fue descrita por Daffos en el manejo de un feto con trombocitopenia autoinmune (30).

Bang, fue el pionero en tratar un feto severamente afectado por isoinmunización Rh, mediante transfusión intravascular percutánea con control ecográfico, inyectando la sangre directamente en la vena umbilical intrahepática, utilizando una aguja No. 18 (8). Crespigny, reportó también éxito en 3 de 4 casos, utilizando una técnica similar (18). Sin embargo, el acceso a la vena umbilical en su porción intrahepática, presenta el riesgo de lesionar estructuras abdominales o de provocar una hemorragia intrahepática. Recientemente se ha descrito la transfusión intravascular, mediante la punción de la vena umbilical cerca de la inserción del cordón en la placenta, o en el abdomen fetal (19, 23, 31), con lo cual se obtienen las ventajas de la transfusión intravascular con la simplicidad de la guía ecográfica, y evitando el riesgo que representa el acceso a la porción intra-abdominal de la vena umbilical.

Aún faltan por establecer parámetros definidos sobre el volumen de sangre que debe transfundirse, y el intervalo entre cada transfusión. Aunque

algunos autores prefieren realizar una exanguinotransfusión (19), en un intento por disminuir el riesgo de sobrecarga cardíaca, la mayoría se limita a transfundir un volumen de glóbulos rojos calculado, para obtener un hematocrito fetal entre 30 y 40% (6, 17, 18, 23, 8, 31, 32).

Estos valores de hematocrito, son los que se han encontrado en fetos sin enfermedad hemolítica, en quienes se han hecho determinaciones de Hemoglobina y Hematocrito en sangre del cordón, durante el 2o. y 3er. trimestre (33).

Aunque se ha descrito la curarización del feto (18, 34) para la realización del procedimiento, consideramos que ésta no es necesaria en forma rutinaria, y que debe reservarse para aquellas situaciones en que por la localización de la inserción del cordón, la aguja debe atravesar un gran trayecto de la cavidad amniótica cerca de las extremidades o el tronco del feto, o deba realizarse la punción cerca de la inserción del cordón en el abdomen fetal.

En los demás casos, la sedación materna con Meperidina y Diazepán, produce una inmovilidad fetal suficiente para realizar el procedimiento con comodidad (32).

El caso que presentamos en este artículo, se trataba de un feto severamente afectado como lo hacían suponer la historia materna y las pruebas

biofísicas y de laboratorio; y como lo confirmaron las determinaciones de hemoglobina en sangre de cordón, tanto en el momento de la transfusión como en el nacimiento, así como la cantidad de exanguinotransfusiones que requirió después del parto. Gracias a la transfusión intrauterina, se logró aplazar el nacimiento hasta el momento en que presentaba madurez pulmonar suficiente para no agregar un síndrome de dificultad respiratoria al cuadro patológico, ya de por sí complicado, que presentaba este niño.

Resumiendo: La Transfusión Intravascular Inútero, representa un avance significativo en el manejo de isoimmunización por Rh. La utilización de la ecografía para guiar la introducción percutánea de la aguja en la circulación umbilical cerca de la raíz del cordón o del abdomen fetal, simplifica mucho el procedimiento. Aunque existen todavía algunas dificultades técnicas y se requiere de experiencia ecográfica, esta técnica ofrece grandes ventajas en el tratamiento de estos fetos severamente enfermos.

RESUMEN

Se presenta un caso de transfusión intravascular Intrauterina bajo control ecográfico, en un feto severamente afectado por isoimmunización Rh. Las ventajas y los inconvenientes de las distintas técnicas de transfusión intrauterina son discutidas en este artículo.

BIBLIOGRAFIA

1. BOWMAN, J.M.: The management of Rh Isoimmunization. *Obstet. Gynecol.* 52: 1, 1978.
2. CLEWELL W.H., DUNNE M.G.; JOHNSON M.L. et al: Fetal Transfusion with real time ultrasound guidance. *Obstet. Gynecol* 57:516, 1981.
3. FRIGOLETTO, F.D.; UMANSKY, I.; BIRNHOLZ, J. et al: Intrauterine fetal transfusion in 365 fetuses during fifteen years. *Am. J. obstet. Gynecol* 139: 781, 1981.
4. HARMAN, C.R.; MANNING, F.A.; BOWMAN, J.M. et al: Severe Rh disease Poor outcome is inevitable. *Am. J. Obstet. Gynecol* 145: 823, 1983.
5. PEPPEREL, R.J.; COOPER, I.A.: Intense Antenatal Plasma Pheresis in severe rhesus isoimmunization. *Aust NZ J. Obstet. Gynecol* 18: 121, 1978.
6. RODECK, CH.; HOLAMN, C.A.; KARNICKI, J. Direct Intravascular fetal blood transfusion by fetoscopy in severe isoimmunization. *Lancet* 1: 625, 1981.
7. RODECK, CH. Fetoscopy guided by real time ultrasound, for pure fetal blood samples, fetal skin samples, an examination of the fetus in utero. *Br. J. Obstet. Gynecol* 87: 449, 1980.
8. BANG, J.; BLOCK, J.E.; TROLLE, D. Ultrasound guided fetal intrauterine transfusions for severe rhesus hemolytic disease. *Mr. Med. J.* 1: 373, 1982.
9. BOWEN, F.W.; RENFIELD, M.: The detection of anti-D in Rh (D). negative Infants born of Rho (D)— positive mothers. *Pediatr. Res.* 10: 213, 1976.
10. LILEY, A.W.: Intrauterine transfusion of fetus in haemolytic disease. *Br. Med. J.* 2: 1107, 1963.
11. HAMILTON, E.G.: Intrauterine Transfusion: safeguard of peril. *Am. J. Obst. Gynecol* 50: 255, 1977.
12. PALMER, A.; GORDON, R.R.: A critical review of intrauterine fetal transfusion. *Br. J. Obstet. Gynecol* 83: 688, 1976.
13. HASHIMOTO, B.; FILLY, R.; CALLEN, P.: Absorption of fetal intraperitoneal blood after intrauterine transfusion. *J. Ultrasound Med.* 6: 421, 1987.
14. BERKOWITZ, R.I.; HOBBS, J.C.: Intrauterine Transfusion utilizing Ultrasound. *Obstet. Gynecol* 57: 33, 1981.

15. FRIGOLETTO, F.D.; BIRNHOLZ, J.C.; ROTHCHILD, S.B.: Intrauterine Transfusion with the use of phased array ultrasonography: A new Technique. *Am. J. Obstet. Gynecol* 128: 239, 1977.
16. PLATT, L.D.; KEEGAN, K.A.; DRUZIN, M.L.: et al: Intrauterine Transfusion utilizing linear-array, real time B-scan: a preliminary report. *Am. J. Obstet. Gynecol* 135: 11 15, 1979.
17. RODECK, CH.; NICOLAIDES, K.W.; WARSOFF, S.L. et al: The management of severe Rhesus isoinmunization by fetoscopic intravascular transfusions. *Am. J. Obstet. Gynecol* 150: 769, 1984.
18. CRESPIGNY, CH.; ROBINSON, H.P.; QUINN, M. et al: Ultrasound guided fetal blood transfusion for severe Rhesus-isoinmunization. *Obstet. Gynecol* 66: 529, 1985.
19. GRANN, P.; COPEL, J.; PLAXE, S. et al: In-utero exchange transfusion by direct intravascular injection in severe erythroblastosis fetalis. *N. Eng. J. Med.* 314: 1431, 1986.
20. BOWMAN, J.M.: Blood group isoinmunization in obstetric practice. *Curr. Probl. In Obstet and Gynecol.* 7: 34, 1983.
21. BOWMAN, J.M.; MANNING, F.A.: Intrauterine fetal transfusions: Winnipeg 1982. *Obstet. Gynecol* 203: 61, 1983.
22. HOBBS, J.C.; GRANNUN, P.; ROMERO, R.: Percutaneous umbilical blood samplig. *Am. J. Obstet. Gynecol* 152: 1, 1985.
23. BERKOWITZ, R.; CHITKARA, U.; GOLDBERG, J. et al: Intrauterine Intravascular transfusions for severe red blood cell isoinmunization: Ultrasound guided percutaneous approach. *Am. J. Obstet. Gynecol* 155: 574, 1986.
24. WARSOFF, S.; NICOLAIDES, K.; RODECK, C.: Hidropesía Inmunitaria y no Inmunitaria. *Clin. Obstet. Gynecol*, 3: 678, 1986.
25. DAFFOS, F.; CAPELLA-PAULOVSKY, M.; FORESTIER, F.: Fetal blood samplig during pregnancy with use of a needle guided by ultrasound: A study of 606 consecutive cases. *Am. J. Obstet. Gynecol* 153: 655, 1985.
26. Special Report: The status of fetoscopy and fetal tissue samplig. *Prenat Diagn* 4: 79, 1984.
27. RODECK, CH.: Obstetric Techniques in prenatal diagnosis. En: RODECK CH.; NICOLAIDES, K.H.; ed. *Prenatal Diagnosis*. London: Royal College of Obstet. and Gynecol. 15: 1984.
28. DAFFOS, F.; FORESTIER, F.; CAPELLA-PAVLOVSKI, M.: Fetal blood sampling during the third trimester of pregnancy. *Br. J. Obstet. Gynecol* 91. 118, 1984.
29. DEVORE, GR.; VENUS, I.; HOBBS, J.C.: Fetoscopy: general clinical approach. En: ROCKER, I.; LAWRENCE, K.M. eds. *Fetoscopy*. Amsterdam: Elsevier/North-Holland: 51, 1981.
30. DAFFOS, F.; FORESTIER, F.; MULLER, J.Y. et al: Prenatal Treatment of alloimmune thrombo cytopenia. *Lancet* 2: 632, 1984.
31. BERKOWITZ, R.L.; CHITKARA, U.; GOLDBERG, J.D.; et al: Intrauterine transfusion in-útero: the percutaneous approach. *Am. J. Obstet. Gynecol.* 154: 622, 1986.
32. BERKOWITZ, R.L.; CHITKARA, U.; WILKINS, I.; et al: Technical aspects intravascular intrauterine transfusions: Lessons learned from thirty-three. *Am. J. obstet. Gynecol* 157: 4, 1987.
33. NICOLAIDES, K.H.; RODECK, C.H.; MILLÁR, D.S. et al: Fetal Hematology in Rhesus Isoimmunization. *Br. Med. J.* 290: 661, 1981.
34. CRESPIGNY, C.H.; ROBINSON, H.P.; QUINN, M. et al: Curarisation of Fetus for intrauterine procedures. *Lancet* 1: 1164 1985.