ella. El autor anota la frecuencia con que el tratamiento arsenical dado tardíamente en el embarazo, es inadecuado y cree que la terapia con Penicilina es el tratamiento de escogencia en la sífilis prenatal,

siempre y cuando que tests serológicos sean practicados a intervalos mensuales con el objeto de despistar posibles recaídas e instituir un nuevo tratamiento.

G. L. E.

Diagnóstico del sexo del feto durante el embarazo

L. P. Klotz.

Gynecologie et Obstetrique. París Nº 1. En. 1949.

El interés por conocer el sexo del feto en gestación ha originado muchas investigaciones. Pero así también ha sido el fracaso de repetidas tentativas. Ahora, el doctor L. P. Klotz, tomando como punto de partida el método de Ascheim-Zondek, para el diagnóstico del embarazo, pero utilizando conejos, publica en la revista de Obstetricia y de Ginecología de París las conclusiones de sus estudios referentes al tan controvertido tema.

Dice Klotz que su método da un 96% de positividad en embarazos del 5º mes en adelante. La técnica se resume en lo siguiente:

El conejo macho utilizable es aquel cuyos testículos se encuentran en el trayecto emigratorio de los canales inguinales. Se inyectan 10 centímetros cúbicos de orina de la gestante en la vena marginal externa

de la oreja y se extraen los testículos pasadas 48 horas. Se fijan durante 24 horas en líquido de Tellyesniczky, se les lava después con agua y a continuación uno se conserva en alcohol de 80º para el diagnóstico macroscópico y el otro se incluye en parafina para hacer cortes de 7 micrones de espesor y hacer su examen microscópico.

La concordancia entre el aspecto macroscópico (congestión de los vasos sanguíneos superficiales del testículo) y el microscópico (actividad de la espermatogénesis) da una seguridad casi absoluta de sexo femenino. En caso contrario será masculino.

A pesar del porcentaje tan alto anotado por el autor, él mismo dice que seguirá sus investigaciones para llegar a una certeza total.

R. T. S.