Tratamiento analgésico, antiflogístico y resolutivo en los procesos inflamatorios de los anexos

Por **HELMUT WAGNER**

Aerztl. Wschr., 6, 832 (1951).

RESUMEN

Opina el autor, que el tratamiento inmediato de los procesos inflamatorios de los anexos no se debe limitar a la mera terapéutica antibacterial, sino tiene que comprender a la vez medidas analgésicas y antiflogísticas eficaces. Por eso ha tratado 140 casos de anexitis y parametritis dolorosas con el nuevo preparado pirazólico Irgapirina, de notable acción analgésica y antipirética, que consiste en una combinación al 30% de Butazolidina, de pronunciado efecto antiflogístico, y dimetilaminofenil-dimetilpirazolona.

La interpretación crítica del efecto resolutivo de la Irgapirina fue dificultada en los casos agudos por el tratamiento simultáneo con sulfamidas y penicilina y en las salpingitis crónicas por el tratamiento de ondas cortas practicado a la vez. Por consiguiente fueron ante todo las indicaciones de las pacientes las que sirvieron para apreciar el efecto terapéutico.

Una inyección intramuscular diaria de 5 c. c. de Irgapirina bastó por lo regular para dominar con seguridad hasta los dolores más intensos.

Sólo en casos excepcionales fue necesaria una segunda inyección para conseguir una analgesia de 24 horas.

La mejor acción la tuvo la Irgapirina en los procesos agudos y sub-agudos de los anexos, en los que cesaron o disminuyeron considerablemente las molestias en muy poco tiempo. Pero también las salpingitis y parametritis crónicas reaccionaron bien a la terapéutica por la Irgapiridina en el 80% de los casos. Este resultado tiene especial significación porque el 70% de estas enfermas habían sido tratadas ya sin resultado con otros medicamentos. A causa del «estar enferma» en la constitución neuropática, a menudo el dolor se había «independizado» por decirlo así como entidad morbosa propia. También este círculo vicioso se pudo romper con la Irgapirina.

Como resultado de sus investigaciones, recalca el autor, que con la Irgapirina se pueden obtener resultados satisfactorios tanto en los procesos inflamatorios agudos de los anexos como en los casos insidiosos y en las disfunciones vegetativas con algias, espasmos y rigidez del tejido conjuntivo de la pelvis.

(De la Clínica de Mujeres de la Universidad de Maguncia - Director: Profesor doctor Kräuter).