Estadística del Servicio de Esterilidad del Hospital "San José" - Bogotá

DOCTOR J. LUNA URIBE

Como esbozo de estadística del trabajo ejecutado por el Departamento de Esterilidad del Hospital San José, desde agosto 4 de 1952, presentamos el resultado práctico que el estudio de las historias clínicas permite obtener.

Consultaron un total de 99 mujeres, de las cuales 55 (55%) acusaban es-

terilidad primaria y 44 (45%) esterilidad secundaria.

Después del plan rutinario de estudios se llegó a la conclusión de que la

posible causa de esterilidad era de origen:

A) Tubario en veintisiete casos; divididos en nueve de estenosis y dieciocho de impermeabilidad u oclusión tubaria. De estos casos fueron tratados cinco, con persuflación durante el acto quirúrgico en el que se practicó una salpingo plastia; controles posteriores certifican el éxito de la intervención, ya que a la insuflación uterotubaria se aprecía permeabilidad en cuatro de ellos, y un fracaso en el cual no se obtuvo paso del gas en los controles.

B) Cervical en cuatro casos; en tres de ellos se encontró una cervicitis rebelde; de estas pacientes está una en control y dos han abandonado el estudio. En el otro caso se encontró una estrechez del conducto cervical y fue tratado qui-

rúrgicamente.

C) Ovárico endocrino en seis casos; se llegó al diagnóstico de ovaritis escleroquística, y se practicó en cuatro de ellos la resección cuneiforme de los ovarios; los otros dos están listos para su tratamiento quírúrgico; de los casos intervenidos dos se han perdido de vista. En dos casos se hallaron deficiencias hormonales y se instituyó, el tratamiento médico adecuado. También fueron atendidos dos casos de atresia de los órganos genitales, uno de los cuales está actual mente en control y el otro se perdió de vista.

D) En cuanto a Factor Marido se tropieza con la poca colaboración, ya que de noventa y nueve pacientes femeninas, únicamente diecinueve maridos

asistieron a la consulta, y de éstos la mayoría (por no decir la totalidad) concurrieron una sola vez. De ellos, cinco se pueden considerar como causa de esterilidad, pues se encontraban alteraciones al estudio del espermograma. En los demás maridos (14) que concurrieron, no se halló ninguna alteración que explique la esterilidda de la pareja.

Como otros datos de interés, obtuvimos:

- 1º-En dos pacientes estudiadas, no se encontró causa orgánica ni funcional que explicara su esterilidad; afortunadamente sus maridos concurrieron a consulta y se estableció, en uno de ellos una azoospermia y el antecedente de irradiaciones vesicales; y en el otro alteraciones en el spermograma que pueden explicar dicha esterilidad.
- 29—Se han perdido de vista (nos referimos a pacientes que no asisten a control por lo menos desde mayo del presente año) treinta y nueve casos, lo que correspondería a un 42,8%; entre ellos se cuentan algunos de los casos tratados para su probable causa de esterilidad, lo cual nos impide verificar el éxito que estos tratamientos pudieran haber tenido.
 - '39-Permanecen en estudio cuarenta y ocho casos.
- 49—Unicamente podemos informar con certeza de un caso de embarazo, ya que la paciente concurre periódicamente a los controles; sin embargo se nos ha informado de otra paciente que está en las mismas condiciones, y estamos esperando que concurra a una cita que se le envió para establecer la verdad de la información.