

Material suplementario

Tabla suplementaria 1.

Criterios diagnósticos de RCF. The Society for maternal-Fetal Medicine (SMMF), american college of obstetricians and gynecologists (ACOG), Sociedad de perinatología de Barcelona (SPB), peso estimado fetal (PEF), perímetro abdominal (PA), arteria cerebral media (ACM), relación cerebro placentaria (RCP), flujo ausente en diástole de arteria umbilical (FADAU), flujo reverso en diástole de arteria umbilical (FRDAU), ductus venoso (DV).

SMMF/ ACOG	Consenso Delphi	SPB
RCF: PEF o PA menor al percentil 10 para la edad gestacional, se recomienda tablas poblacionales (Hadlock).	<p>RCF temprano < 32 semanas en ausencia de anomalías congénitas.</p> <p>PEF/PA < percentil 3 o FADAU</p> <p>O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PEF/PA < percentil 10 combinado con 2. IP AUT > percentil 95 y/o 3. IP AU > percentil 95 	<p>PEG: PFE > percentil 3 y < percentil 10 + doppler normal.</p> <p>RCF estadio I: PFE < percentil 3 o PFE < percentil 10 + (ACM < percentil 5 o RCP < percentil 5 o IPm AUt > percentil 95).</p> <p>RCF estadio II: PFE < percentil 10 + FADAU.</p> <p>RCF estadio III: PFE < percentil 10 + (FRDAU o IPDV > percentil 95 o FAD DV).</p> <p>RCF estadio IV: Flujo diastólico reverso en el DV.</p>
	<p>RCF tardío > o igual de 32 semanas en ausencia de anomalías congénitas, o al menos dos de tres hallazgos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PEF/PA < percentil 10. 2. PA/PEF descenso de > 2 cuartiles de crecimiento. 3. RCP < percentil 5 o IP AU > percentil 95. 	

Tabla suplementaria 2.

Prevalencia de RCF según criterios ecográficos. The Society for maternal-Fetal Medicine (SMMF), Sociedad de perinatología de Barcelona (SPB), intervalo de confianza (IC), restricción de crecimiento fetal (RCF), pequeño para la edad gestacional (PEG).

Criterio	Frecuencia n.º	Prevalencia %	IC 95 %
SMMF Normal RCF	178 50	21,93	(16,73-27,56)
Consenso Delphi normal RCF	219 9	3,95	(1,82-7,36)
MFB normal RCF	190 38	16,67	(12,07-22,15)